

DISSERTATIO INAUGVRALIS MEDICA

DE

# AVDITV DIFFICILI

---

QVAM

CONSENSV ILLVSTRIS MEDICORVM  
ORDINIS

PRO

GRADV DOCTORIS

MEDICINAE AC CHIRVRGIAE  
OBTINENDO

PVBlice DEFENDET

DIE IX. MART. MDCCLXXXIII

A V C T O R

IOHANNES FRIEDERICVS  
KRITTER

GOETTINGENSIS

---

GOETTINGAE

IN OFFICINA BARMEIERIANA.

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1<sup>mo</sup>) Instruimenti in tubam immissio, cum ob meatus nasalis figuram et longitudinem variam, et orificii tubalis diuersam prominentiam, mobilitatem, latitudinem, quae variam quoque tubuli curuaturam requirunt; tum ob sternutationem, in eius introductione vix euitabilem, saepius difficillima erit, ceu plane impossibilis.

2<sup>do</sup>) Iniectio sine effectu e tuba refluat, si non profunde satis in ipsam penetrauit cannula. Semper denique notante cl. HAGSTRÖM *k*) metus adest, ne

3<sup>o</sup>) Materiam tubae inhaerentem altius in ipsam intrudat injectio.

#### §. 34.

Minus difficultatis sequens fluidi in tubas immittendi methodus habere videtur, a cl. MORGAGNO *l*) et BVSSONO *m*) propositus.

*k*) Samml. f. pr. Aerzte 14. B. 1. St. n. 2.

*l*) Epist. anat. 7. n. 14.

*m*) In HALLERI disp. chir. sel. T. 2. n. 44.



positus. Liquorem aptum ore excipit ac-  
ger, ac spiritum dein in oris cauum va-  
lide propellit. Quo facto fluidum, nec  
per os, nec nares, sed arcte antea clausa,  
erumpere valens, et aeris impetu in tu-  
bam impulsam, materiam, ipsae inhaeren-  
tem forsan loco mouebit atque eluet.

Quodsi memoratis haecenus auxiliis nil  
profectum sit, obstaculi profundius tubae  
inhaerentis suspicio oritur, in quo casu ab  
iniectione per processum mastoideum facta  
vnice aliquid expectandum erit.

### §. 35.

Vbi parietum tubae coalitu inflamma-  
torio, membranae tubae inuestientis ineras-  
satione, excrecentiis ex eadem enatis, eius  
cauum clausum est, sili in tubam immis-  
sio, saepius iterata, sola canali referando  
par esse videtur. Eiusmodi saltem mede-  
lam in furdo, post omnia incassum adhi-  
bita, feliciter instituit cl. WATHEN<sup>n)</sup>.  
Specillo enim extracto continuo se melius  
audire

n) l. c.

audire aeger professus est. Quod curationis genus, si ob difficultates memoratas locum non habeat, operatio a cl. RYOLANO o) proposita cum successu forsan institui posset. In defectu dicit "huius canaliculi per-  
 „vii, quidni conferret stylo tenuissimo per-  
 „tusa apophysis mastoidea cauernosa, quae  
 „communione[m] habet cum concha"? Felici experimento hoc inuentum nuperrime confirmauit cl. LOEFFLER p). Viro grauissime audienti cum processum mastoideum perforasset liquidumque iniecisset "cl. vir, sanguinis quidem sero commixti aliquid effluxit, fluidum vero iniectum in fauces non penetrauit. Auditus qui ad primam iniectionem statim euaserat melior, vulnere deligato iterum intercidit; emplastro remoto omnia percepit aeger. Vulnere dein sensim coeunte, auditus pariter fiebat hebetior, penitusque demum interiit; apertura prorsus clausa. Processu itaque denuo re-  
 F 2 fera-

o) Animadv. in theat. BAUHIN. p. 423.

p) cf. ill. RICHTERI cl. B. 10. B. 14. St.

serato, apertura noua turundis aperta ser-  
vata fuit, eiusque labiis tandem cicatrifatis,  
auditu maxima fere ex parte restituto ite-  
rum gauisus est aeger.

### §. 36.

Tympani cauitatis imperuiatio, si mem-  
branarum caueam dislepientium, excrescen-  
tiarum e membrana ipsam inuestiente assur-  
gentium, sequela est, nullo artis auxilio  
tollenda esse videtur. Vbi vero extrauasa-  
tum aliquod, mucosum, purulentum, etc.,  
caueam opplet, huius educatione, iterum  
peruia reddi poterit.

Quando liquidius est extrauasatum, sub  
situ capitis inclinato, sponte interdum e  
tuba in os effluit, id quod in aegro cl.  
VALSALVAE *q)* et surdis supra *r)* memo-  
ratis accidit.

Tenaciôr materiae stagnantis indoles  
injectionem poscit in tympani cauum, vel  
per

*q)* Vid. MORGAGNI *epist. anat.* 7. n. 6.

*r)* cf. §. 16. n. 3.



per tubam EUSTACHII, seu cellulas mastoideas, seu meatum auditorium myringemque perforatam, administrandam. Prior iniectio minus hic apta videtur, cum cellulis mastoideis simul obstructis, extrausato ex his quoque educendo non sufficiat, monente cl. HAGSTRÖM s). Cellularum enim, in tympanum sese aperientium, orificia altius sita sunt, quam tubae apertura interna. Hinc fluidum, priusquam cellulas intrauerit, per tubae orificium, quod fundo caeae proprius est, refluat.

### §. 37.

Euitatur hoc incommodum, si per cellulas processus mastoidei perforatas in tympanum immittitur liquor.

Encheiresis huius operationis sequens est.

Cute in media processus mastoidei parte *t*) usque ad os dissecta, ossis super-

F 3

ficies

s) l. c.

*t*) Haemorrhagiae molestae, ex arteria auriculari posteriore, cuitandae gratia, cl.

HAG-

superficies parvo circuitu denudatur. Tre-  
pano dein perforatorio, conica corona in-  
structo *u*), vel simili instrumento, apophy-  
sis media sur parte *x*) perforatur, donec  
vnam alteramue cellulam aperiat instrumen-  
tum *y*).

Quo  
HAGSTRÖM (l. c.) cutem magis versus  
apophyseos partem anteriorem ac postero-  
rem discindere suadet.

*u*) Conica instrumenti perforantis figura,  
monente ill. RICHTERO (chir. Bibl. 10. B.  
4. St.), impedit, quo minus iusto altius in  
ossis substantiam illabetur instrumentum,  
quod sibi fere, in aegro memorato (cf.  
§. 35.) accidisse fatetur cl. LÖFELER.

*x*) Apophyseos pars media, tres circa qua-  
drantes digiti a processus mastoidei apice  
distans, ideo perforationi aptissima est,  
quod hoc loco cellularum superficialium  
maxima, quaeque directione horizontali in  
tympanum continuatur, ossi subiacet, no-  
tante cl. MURRAY (l. c.).

*y*) Ne iusto altius terebretur, specillo in-  
terdum inquirendum est, num ad cellulas  
iam peruentum sit.



Quo tunc educto, syringis ope fluidum in aperturam recentem iniicitur, e tympano per tubam Eustachii una cum elutis sordibus statim plerumque in fauces effluens. Quodsi iterata iniectione opus est, turundis aliquamdiu apertum servari debet vulnus.

Felici cum successu in surditate a puris in tympano accumulatione orta, hoc iniectionis genus adhibuit cl. IASSERVS 2), et post eum simili cum euentu in quatuor aegris cl. FIELITZ a).

Multis interim operationis huius utilitas, cum ob pericula haud levia quibuscum iuncta sit, tum ob eius euentum semper dubium, admodum suspecta esse videbatur. Pericula in operationis administratione obvia praecipua sunt:

1) Partium auris internarum laesiones.

Abstinentum itaque est ab operatione in

F 4

sub.

2) Vid. ill. SCHMUCKER verm. ch. Schr.

3. B. p. 113. sqq.

3) Vid. ill. RICHTERT ch. B. 1. 8. B. 3. St.

9. B. pag. 555. 10. B. 4. St.

subiectis iunioribus, vel quibus apophysis parum prominet. In his enim cum vel plane deficient cellulae, vel nondum efformatae sint, si aditum ad tympanum aperire velles, necesse foret altius perforare ossis substantiam, non sine laesionis interiorum organi metu *b*).

2) Symptomata irritationis, quae liquidum immissum, nisi statim ex aure refluat, ac aliquamdiu in tympano retinetur, quandoque excitat. Surdo cl. HAGSTRÖM *c*) liquor in cellulas iniectus non modo in fauces non penetrabat, sed cephalalgia quoque grauis, aurium tinnitus, ac visus abolitio, sub quavis iniectione contigit. Loco denique perforationis minus caute electo, facillime

3) Vtraque ossis lamella perforatur, cerebrique accidit laesio, quale quid in infelici operatione cl. CÖLPINI accidisse vide-

*b*) Samml. für pr. A. 14. B. 11. St. n. 2. 3.

*c*) Ibid.



tur *d*). — Vtilitas denique operationis nulla esse potest, si

4) Cellarum defectu, vel obstructione liquori ad tympanum aditus denegatur. Vbi interim muco tantum obturantur cellulae, iniectio repetita eas forsan iterum aperiet.

### §. 38.

Vltimum denique extravasati e tympano educendi adminiculum est myringis incisio, quae non extravasato solum exitum e cavea aperit, sed liquori simul medicato viam in tympanum parat. Quum interim sine myringis ac ossiculorum labe gravissima vix perfici queat haec operatio, tum modo in usum vocanda esse videtur, si tubae EUSTACHII vel cellularum apophyseos mastoideae imperuiatio non superanda, iniectioni per has partes aditum ad tympanum praeccludant, extravasati vero indoles acrior, et hinc pertimescenda organi universi caries, celerem exposcat materiae flagrantis educationem.

F 5

### §. 39.

*d*) cf. Salz. chir. Zeit. J. 1790. 3. St



Obstructionis cauearum labyrinthi, vti  
diagnosis, ita et cura plerumque impossibi-  
lis erit.

Quodsi interim humorum labyrinthi in-  
spissatio in suspicionem veniat, ab electrici-  
tate, quae non modo humorum huius ca-  
veae secretionem adaucta, materiae ibi stag-  
nantis tenacitatem fundere, sed vasa simul  
ad citam eius resorptionem instimulare valet,  
si ab ullo remedio, auxilium hic expectari  
poterit.

Tumore in labyrintho enato, ossium in-  
tumescentia si cauea imperuia redditur, cu-  
ram nullam admittet malum.

Sic etiam in labyrinthi carie, membra-  
narum huius cauitatis exulceratione, auditus  
conseruandi nulla omnino spes erit, cum haud  
prius sese manifestet malum, quam vbi par-  
tium auris internae erosionem in tympanum  
sibi viam strauerit ichor. In quo casu om-  
nis cura in eo consistet, vt iniectionibus ido-  
neis caries praesens coerceatur, corrupti se-  
cessus

cessus promoueat ac vlcus denique subsequens conſanetur.

§. 40. Quodſi partium machinae auris vitium aliquod immedicabile hanc ſonis ad labyrinthum vel neruum auditorium propagandis ineptam reddit, vnica interdum via, quae dummodo neruus ipſe illaeſus eſt, ſoni ſenſatio aegro procurari poteſt, in machinae vſu conſiſtit, tremores ſonoros per oſſa cranii neruo communicantis. A cl. VERNEYO *e*) iam fuit annotatum, furdaſtros quandoque multo acutius audire, ſi ſuper capite ipſorum loquatur, eiſdemque generis methodus ille eſt, quo Hiſpanum quendam furdis mutiſque, dum occipiti eorum raſo voces inſcribat, auditum ac loquelam reſtituiſſe ſcribit de CASTRO *f*).

Optime interim, ſonis hac via percipiendis, inſeruit bacillus ligneus, mediocriſ longitudinis, ac eiſ craſſitiei, vt commode ore furdi teneri poſſit. Huius vnam extremitatem

*e*) l. c.

*f*) Miſc. nat. cur. Dec. II. a. 12 obſ. 35.



tem dentibus detinet surdus, ita tamen ut labiis aut lingua ipsam non attingat. Alteram dentibus eius, quocum confabulari vult, simili modo tenendam porrigit, vel cuius alio corpori sonoro, uti instrumento musico etc, cuius sonum audire cupit, applicat, atque ita omnia, quae secus intelligere non poterat, distincte percipit. Plura huc pertinentia apud A. E. BÜCHNERUM *g)* et cl. KRZOWITZ *h)* inueniuntur.

#### §. 41.

E variis, quibus nervus auditorius obnoxius est, vitiis destructio ac atrophia curam nullam admittere videntur.

Maior erit auditus restituendi spes, si nimia nerui ficcitate auditus laesus esse videatur. In hoc casu praeter remedia vniuersum corpus humectantia *i)*, uti potus assumtionem liberiores, balnea tepida etc, ab electricitate imprimis cuius egregiam in humorum

*g)* Abh. v. e. besond. u. leicht. Art Taube hörend zu machen §. 28.

*h)* l. c. 209. seqq.

*i)* Cf. §. 19. III.



SERENISSIMO

PRINCIPI AC DOMINO

DOMINO

LVDOVICO DECIMO

HASSIAE LANDGRAVIO

PRINCIPI HERSFELDIAE, COMITI IN CAT-  
TIMELIBOCO, DECIA, ZIEGENHAYNA,  
NIDDA, HANONIA, SCHAVMBVRGO, ISEN-  
BVRGO ET BVDINGA REL. REL.

CAESAREI RVSSICI ST. ANDREAE

ET REGII BORVSSICI ORDINIS AQVILAE  
NIGRAE EQVITI CET. CET.

PRINCIPI AC DOMINO SVO

CLEMENTISSIMO

SACRA

STEFANUS

PRINCIPALIS DE DOMINO

DOMINO

ADOLPHO DECIMO

HAUSTIAE IANUARIA

PRINCIPALIS DE DOMINO

IMMENSIO DECA

DECA, HANNOVA, SINGAPORE

BARCO ET RADINIA

CAESARIS DECA

REGIA DECA

DECA

PRINCIPALIS DE DOMINO

CLEMENTISSIMO

ADOLPH

## SECTIO I.

### *Auditus difficultatis pathologia.*

**A**uditus difficultas, cuius succinctam historiam in sequentibus exhibere statuimus, morbus est, cum gradu, quo auditu privat aegrum, tum et decursus ac ortus ratione diuersa, vti et symptomatum vel morborum, quibuscum coniunctus apprehenditur, multifariam admittens varietatem.

Omnem interdum auditum tollit (cophosis, surditas perfecta); interdum soni perceptionem modo minuit (auditus difficultas, baryecolia); et quidem ita, vt vel sonum quenuis iusto difficilius percipiat aeger, vel sonorum certi generis sensu ad-

A. . . . . huc



huc gaudeat. Posterioris rei exemplum in iuvene obseruauit cl. STAHL a), qui praeter tibiae pastoralis, nullius alius fistulae sonum audire poterat.

Decursus morbi continuus esse solet, quandoque tamen remissiones et intermissiones habet, ceu vagas ceu periodicas.

Subito quandoque oritur, nonnumquam lente ac gradatim ingrauescit.

Vtramque saepius infestat aurem, interdum vnâ modo, sanae auris sensu ita hic subinde adaucto, vt alterius laesionem vix deprehendat aeger b). Vnius interim auris auditu violato idem haud raro alteri quoque imminet periculum.

Varii generis affectibus saepe coniuncta deprehenditur auditus imminutio. Aurium tinnitum, fluxum, vlcus, otitidem subinde comitat, sensuum aliorum vitiis, vti visio- num spectris, amaurosi, anosmiae; vertigini, capitis dolori pertinaci; aphoniae artuum paralyfi, aliisque neruosi systema-

a) Colleg. casual. magn. cas. 76.

b) RIEDLINI lin. med. a. 4. p. 627.

his affectibus; frequenter iuncta est. Fe-  
brim denique, cum acutarum, tum inter-  
mittentium; morborum exanthematicorum;  
arthritidis, huius, venereae etc; symptoma  
est non infrequens.

§. 2.

Auditus grauitatis in regionibus quibus-  
dam frequentia; hereditaria perinde, quam  
in familiis nonnullis observamus, ad audi-  
tus hebetudinem procliuitas, cuius famo-  
sissimum exemplum memoriae dedit, cl.  
(RZOWITZ), recidiuae denique huius  
morbi, ubi semel adfuit, tam crebrae, mul-  
taeque aliae, certam quandoque huius morbi  
existere praedispositionem, manifeste pro-  
ant. Haec vero duplici inprimis statu in-  
dici videtur, ceu congenito, ceu acquisito.

1mo) Organorum auditus statu laxiore.  
hinc infantes; sanguinis ad caput conge-  
ioni obnoxii, tam crebro auditus graui-  
tem experiuntur. Commoratio in locis

A 2

humi-

c) Histor. de cophos. pag. 6. 9.



humidis, nebulosis, austri insigniter huic morbo fauent *d*). Ob solam denique hanc partium atoniam, obaudito a vasorum auris nimia impletione orta, vasis licet depletis, subinde recurrit. Sic feminae meminit GOHLIVS *e*), quae desinente fluxu menstruo in baryecoiā inciderat. Haec, malo licet licet remediiis fugato, quouis tamen tempore, ubi menses redire debuissent, obauditione periodica molestabatur. Apud HEISTERVM *f*) surdus auditum, venae sectionis ope aliquoties iam restitutum, breui post semper denuo amisit. Vetula, a multis iam annis coeca furdaque, cum capite aliquando valide in lapides prolapsa esset, sub ingenti vulnerum haemorrhagia auditum recepit, qui vero, contusionum remittente inflammatione, iterum interiit *g*).

*d*) HIPPOCR. aphorism. Sect. 3. aph. 5.

*e*) Act. med. Berolin. Dec. 5. art. 2. Nro. 74

*f*) Med. u. chirurg. Wahrnehm. 2 B. n. 340

*g*) Misc. nat. cur. dec. 2. a. 6. obs. 264.



2<sup>do</sup>) Rigiditate iusto maiore. Inde

imprimis senili aetati, corporibus exsuccis, ut saepenumero sunt hypochondriaci, auditus hebetudo tam familiaris esse videtur.

### §. 3.

Causarum occasionalium, auditum imminuentium, ingens numerus ad sequentes praecipue classes redigi posse videtur.

Imminuitur nempe audiendi facultas:

1<sup>mo</sup>) Causis, quae sanguinem ceu in capitis vel auris vasis nimia copia accumulunt.

2<sup>do</sup>) Causis, quae vires nervosas vel totius corporis vel auris imminuere valent.

3<sup>o</sup>) Acrimoniiis ad auditus organa depositis.

4<sup>to</sup>) Causis quae partes afficiunt, necum consensualem cum aure alentes.

5<sup>to</sup>) Causa quavis, partium auris structuram ac fabricam, ad auditus integritatem necessariam, immediate violante.

§. 4. *ambrosii (ob)*

Sanguinis in capitis vel auris vasis congestioni tribuenda imprimis videtur auditus laesio, quae insequitur sanguinis fluxus solitos suppresos vel subsistentes, vti haemorrhoidum, mensium, fluxum suppressum, narium haemorrhagiam, periodice antea recurrentem non reuersam, venaesectionem solitam omissam *h*). — Causae sanguinis e capite refluxum praepedientes, vti vasorum colli compressio valida *i*), parotidum tumor *k*), grauiditas *l*), capitis commotio vehemens *m*), intumescencia capitis inflammatoria, sub anginae insultu, faciei erysipellate *n*), auditum haud raro labefaciunt. — Surditatem obseruauit LAMZ-

WEERDE

*h*) Cf. cl. KRZOWITZ l. c. p. 19 - 21.

*i*) Hist. de la acad. des scienc. 1705. p. 53.

*k*) STÖRK de cicut. libell. 2. c. 3.

*l*) KRZOWITZ l. c. p. 6.

*m*) ibid. p. 30.

*n*) SCHELLHASS diff. de affect. aur. p. 40.

7

WEERDE o), bubonem eximia magnitudinis in inguine comitantem, quae decrescente bubone decrescebat, crescente crescebat, ac sublato tandem bubone prorsus desinebat. — Similis denique originis ea quoque esse videtur surditas, quae sanguinis nimii ad caput affluxus sequela est. Surditatem perfectam, sub febris intermittentis paroxysmo orientem, ac paroxysmo cessante iterum enascentem, in binis aegris observavit LANZONI p). Auditus sub sternutatione q), narium emunctione valida r), clamore intensiore ac diuturno s), parturitionis nisu t), laesi exempla haud rara sunt. — Venaesectiones topicae superiorum partium, testante WEPPE-

A 4

RO

o) Append. 2. ad SCVLTEI armam. chirurg. obs. 89.

p) Cf. cl. KRZOWITZ l. c. p. 24-25.

q) ibid. p. 12.

r) Ill. RICHTER chir. Bibl. 9. B. 3 St.

s) SCHVLZE diff. de audit. diff. §. 23.

t) KRZOWITZ l. c. p. 15.



RO *u*), auditus grauitati cum vertigine interdum ansam praebent. Baryecoiā non leuē a capitulo calido ortam vidit GERBEZZI *x*).

§. 5.

Laeditur interdum audiendi sensus causis, quae vires neruofas ceu totius corporis, ceu auris solius debilitant. Sic quaeuis causa virium totius corporis inopiam inducens, vti haemorrhoidum, mensium, lochiorum, alui fluxus profusior, labores grauiore, vigiliae ac studia immoderata, lactatio, praesertim in senibus ac cachecticis, HOFMANNO teste *y*) auditui grauem quandoque inducunt labem. Mulieri quinquagenariae a venae sectione largā omnis fere interiit auditus *z*). Siluaticus *a*) grauem audi-

*u*) Observ. med. pr. pag. 296.

*x*) Misc. n. c. dec. 3. a. 3. obs. 9.

*y*) Diff. de aud. diff. §. 13. cf. etiam STAHL diff. de puerp. affect. p. 29.

*z*) RIEDLINI cur. med. n. 993.

*a*) Conf. et resp. med. cent. 2. conf. 18.

auditum cum imbecillitate incessus ac coitus difficultate iuueni cuidam a crebra nimis venere accidisse vidit. Auditus purgantium abusu laesi complura exempla adfert RIVINVS *b*). Surditas post febres remanens vnice interdum a virium languore vniuersali pendet *c*), similemque originem ea quoque agnoscere videtur auditus imminutio, quae animi pathematis, quod vires depriimit, terroris imprimis, sequela est *d*). — E causis aurem solam debilitantibus ante alias hic nominari meretur soni validioris, fragoris perceptio praecipue subita. Duplicem imprimis eiusmodi sonus in aurem edit effectum :

*I mº*) Totum organon commouet, summamque eius partibus inducit atoniam. Hinc sanguinem pyrobalariais ex auribus subinde prolicit tormentorum fragor *e*), nec raro

A 5

inter

*b*) Diff. cit. p. 23.

*c*) STOERK ann. med. I. lul. p. 730

*d*) Misc. n. c. cent. 9. obs. 6.

*e*) Cf. ill. RICHTER chir. Bibl. I B. I St.

inter tinnitum, cephalalgiam, vertiginem, aliaque sanguinis, in minima auris vasa violenter impulsis, signa hic oritur surditas *f*).

2do) Neruo auditorio paralyfin inducit. Sic aliorum quoque sensuum nerui, vt optici, olfactorii, rei graueolentis, ceu lucis validae impressione, paretici quandoque fiunt. Remedia perinde excitantia, vti electricitas, vapores irritantes auribus immissi, sola interdum auditum hic restitunt *g*). Imprimis eiusmodi status accusandus esse videtur, si soni validioris perceptione continua auditus labefactatur, quale quid de fluuiorum, cum strepitu cadentium accolis, RIOLANVS refert *h*). Eodem fere modo capitis quoque laesiones, cum vehementi commotione iunctae, applicata auri relaxantia, narcotica *i*), insultus apoplectici, auditum nonnumquam abolire videntur.

§. 6.

*f*) HILDANI obs. med. chir. cent. 3. Observ. 5. 6.

*g*) Cf. ill. SELLE m. cl. p. 446.

*h*) ENCH. anat. path. L. 4. p. 289.

*i*) BARTHOLIN hist. anat. rar. c. 6. hist. 77.



§. 6. *Acrimoniae* perinde *variae*, ead. *auditus* organa depositae, id *muneris* suo peragendo haec saepius *impares* reddunt. *Auditus* a *transpiratione*, per *refrigerium* suppressa laesi *numerosos* casus *annotantur*. LENTIIUS *k*), SYLVATICUS *l*), FORESTUS *m*), SIMS *n*), multique aliis. Eidem excretioni sensim imminutae ortum quandoque debet obauditio *infantum*, *cibos* viscidos, *farinaeos* auide *appetentium* *o*), qv *et* *eorum*, quibus ob *commorationem* in *locis* humidis *perspiratio* imminuitur. — Interdum *salivationis* suppressae *p*), *fluxus aurium* co-

*k*) ETEODR. m. pr. pag. 71. 1261. -- Misc.

med. pr. p. 1. pag. 64.

*l*) l. c. conf. 20. 21.

*m*) Obs. et cur. med. L. 12. obs. 14.

*n*) l. c. ad §. 11. II. n. 7.

*o*) SCHVLZE diff. de aud. diff.

*p*) F. HOFFMANN opp. t. 4. p. 4. c. 7. Observ. 8.

hibiti *q*), lacrimarum fluxus soliti subsistentis *r*), fluoris albi ad aurem regurgitantis *s*), excretionis per nares obstructae *t*), sequela est auditus grauitas. Exanthematis scabiosi, imprimis achorum retropulsio, virus venerei, variolosi, acrimoniae arthriticae, scrophulosaee etc., ad aurem depositio, idem vitium frequenter adducunt. — Surditatis in febrium decursu enatae causa, in sola nonnumquam materiae morbosae, criseos tempore non prorsus eliminatae, ad aurem metastasi consistit *u*). — Metastaticae denique originis ea etiam est auditus imminutio, in quam alii affectus morborum, uti cephalalgia continua *x*), vertigo *y*), affectus

*q*) Eiusd. conf. et resp. med. cent. 1. cas. 40.

FORESTI obs. et cur. med. L. 12. Obs. 15.

*r*) PEZOLDI obs. med. chir. sel. o. 34.

*s*) Ephem. Germ. dec. 2. a. 7. p. 171.

*t*) RIVINVS diff. cit. p. 23.

*u*) KRZOWITZ l. c. p. 23.

*x*) Ibid. p. 26.

*y*) Ibid.

ctus paralytici, interdum abire obseruantur. Matronae sexagenariae, grauissime audienti, cum insultu apoplectico corripereetur, auditus fuit optimus, illo cessante, denuo iterum intercudit  $\alpha$ ). Viro, a multis iam annis grauiter audienti, sub torporis, lassitudinis ac fornicationis sensu, a coxa usque ad malleolum progrediente, auditus sensim rediit, ac denique euasit acutissimus, dextro latere prorsus resolutio  $\alpha$ ).

#### §. 7.

Aliud causarum, auditum laedentium, genus eas includit, quae partes afficiunt, nexu consensuali cum aures iunctas, hancque, quamuis modo plerumque incerto, in consensum trahere valent. — Sic auditus imminuti non infrequens causa in abdominis visceribus latet. Auditus grauitatem periodicam, vertigine, cephalalgia, oculorum hebetudine, ructibus, flatibus, aliisque abdominis

$\alpha$ ) BÜCHNER misc. med. phys. A. 1727. p. 729

$\alpha$ ) Misc. nat. cur. Dec. 3. a. 7. 8. obs. 203.



dominis affectu signis stipatam, maiorem  
 ventre pleno et cruditatibus abundante, le-  
 viorem cibo cocto ac stomacho vacuo, in  
 hypochondriacis ac abdominalis debilitate  
 laborantibus crebro observari, variis locis  
 testatur F. HOFFMANN *b*). Consensualem  
 hunc abdominis cum aure nexum iam no-  
 vit HIPPOCRATES *c*), quibus dicens bi-  
 „liosae sunt deiectiones, hae oborta sur-  
 „ditate cessant, et quibus adest surditas,  
 „his exortis biliosis deiectionibus finitur”.  
 Vtrumque hoc in grauida observare conti-  
 git cl. STORCHIO *d*). Quae post febrem  
 intermittentem interdum remanet surditas *e*),  
 acrimoniis in abdomine retentis imprimis  
 ortum debere videtur, similemque forsan  
 originem ea agnovit cophosis, qua nar-  
 rante RIEDLINO *f*), per plures annos con-  
 ficta

*b*) Opp. t. 4. p. 4. c. 6. §. 2. 9. 12.  
*c*) Sect. 4. Aph. 28.  
*d*) Obs. clin. ann. 6. p. 334.  
*e*) KRZOWITZ 1. c. p. 24.  
*f*) Obs. med. cent. 1. obs. 57.

flictatus fuit quadragenarius, quaeque ob-  
orto ictero evanuit. —

Laesiones neruorum, cum portione dura  
nerui auditorii anastomosi iunctorum, gra-  
vem interdum auditui inferunt labem. Viri  
meminit LINDHVLT *g*), e vulnere finistri  
supercilii 32 annis grauissime audientis, cui  
malo, nouissimis annis, vehemens adhuc  
aurium fufurrus continensque odontalgia  
superuenit. A vulnere ad initium massete-  
ris illato surditatem inductam fuisse refert  
SMETIVS *h*). Summa inter hoc obauditio-  
nis genus, eamque, quae interdum vulnera  
superciliorum insequitur amaurosin, inter-  
cedit similitudo, ac eodem fere modo,  
quo visum hic aboleri autumat ill. RICH-  
TER *i*), auditus quoque illic induci vide-  
tur iactura. Nimirum nerui laesi, sub vul-

ne-

*g*) Act. Succ. (interpr. KAESTNERO) Vol. 14.

trim. 4. art. 9. p. 313.

*h*) Misc. med. L. 10.

*i*) Anfangsgründe der Wundarzneik. 2<sup>o</sup> B.

§. 321 - 324.



neris cicatrificatione distorti, nimia tensione, quae forsan musculis acusticis, qui nervulos suos a portione dura nervi auditorii accipiunt, spasmum vel paralyfin inducit. Tensionem nervi laesi imprimis hic inculpandam esse C. F. PASCHII observatio confirmare videtur, vbi sub dentitione difficili sinistrae aëris auditus evanuit, dente vero excluso iterum rediit *k*).

Cerebri denique vitia localia, vti extravasata, tumores, intra cranii cavum enata, auditus aboliti interdum existunt causae, qualia exempla DRELINCOVRT *l*) et SEVERINVS *m*) adferunt.

### §. 8.

Ultima denique causarum classis eas comprehendit, quae organorum aëris fabricam naturalem immediate violant. —

Pertinent huc

*Imo*

*k*) Abhandl. a. d. Wundarzn. von den Zähnen. 1 Th. 5 C. §. 4.

*l*) Th. BONET sepulcr. anat. L. 1. §. 2. obs. 53.

*m*) de absc. recond. nat. l. 4. c. 36. §. 2.



1<sup>ma</sup>. Causae omnes solidorum auris  
 continuitatem vitiantes; dum haec vel dis-  
 solvunt, vti vulnera, iniuriae externae, auri  
 illata, ulcera auris corrosiva, acria auri in-  
 fusa, hydrocephalus *n*); vel nimis relaxant,  
 quod euenire potest abusu iniectionum, sub  
 aurium manatione, aeris violenta in aurem  
 impulsione etc.; vel nimiam auditus organis  
 inducunt rigiditatem, quae humorum auris  
 secretionis impeditae, incrassationis ceu os-  
 sificationis membranarum acusticarum etc.  
 sequela esse potest.

2<sup>da</sup> Causae quibus caua auris imminu-  
 untur vel aboluntur, vti humorum accu-  
 mulationes, tumores caua haec opplentes,  
 peregrina in aurem illapsa, membranae  
 praeternaturales, caua dispaescentes, coali-  
 tus parietum cauearum acusticarum etc.

3<sup>o</sup> Primae conformationis vitia.

Harum omnium, sub laesionum, quas  
 auditus organis inferre valent, enumera-  
 tione, aptius fiet mentio.

§. 9.

*n*) Vid infra §. 14. n. II.

B.

## §. 9.

Auditus difficultatis sedes, pro partium, quae aurem humanam constituunt, duplici varietate

1<sup>mo</sup> Vel in partibus sono excipiendo et ad neruum auditorium propagando destinatis, (auris machina, organon) vel

2<sup>do</sup> in neruo auditorio ipso, residere potest. Machinae auris laesae signa generalia sunt:

1) Causa hanc violare, valens surditati ansam dedit o).

2) Nerui auditorii laesi nulla apparent indicia.

3) Per ossa cranii, adminiculis infradicendis p), neruo auditorio adhuc communicari potest sonus. — Nerui auditorii vitio auditum laesum esse cognoscitur:

1) E signorum, machinae laesionem indicantium, absentia.

2) E causae praegressae indole, quae eius generis est, ut neruum auditorium

proxim

o) cf. §. 8.

p) Vide infra §. 40.

proxime afficere videatur, e. g. fragoris perceptione, irritamento abdominali, etc.

3) E surditatis origine repentina. Organi enim vitia lente plerumque auditum absumere solent.

4) Ex auditu in vtraque aure abolito, vel simul, vel in vna aure prius, quam altera. Vtrumque enim suspicionem mouet, communem neruorum acusticorum originem affectam esse.

5) E symptomatibus, cum surditate iunctis, uti visus defectu, visionum spectis, anosmia, soni intolerantia, etc. 6) morbum comitante.

§. 10.

E partium, quae machinam auris componunt, singulis vitiis, leuissimam inter omnes auditui infert noxam auriculæ externae laesio. — Vulnere aut ulcere quandoque auricula absumitur, interdum primae conformationis vitio prorsus deficit. —

Gentes Europaeae pleraeque fasciis ac miris, quos infantium auribus applicant,

B 2 omnem

7) Vid. §. 19.



omnem fere huius partis tollunt mobilitatem, idque vnice forsan in causa est, cui auditu, in genere, minus acutiore gaudeant nationibus feris. Quam parum interim cum eius defectu tum immobilitate imminuatur auditus WEPFERI aeger probat, cui per vlcus tota auricula dextra absumta fuit, auditus tamen ita fere ac antea persistit *r*).

## §. II.

Gravius baryecoiæ genus pori acusticæ externi morbofo statu inducitur. Huius canalæ vitia præcipua sunt:

I) Mala conformatio. Meatum auditorium nimis breuem ac directum, ceu minus flexuosum auditus difficilioris quandoque existere causam affirmat cl. HAAS *s*) Inspectio in aurem ac specillum vitium hoc facile deteget.

II) Imperuiatio, quæ imperforationi congenitæ *t*), membranarum præternaturalium

*r*) l. c. p. 879.

*s*) Diss. de aud. vitiis.

*t*) KRTGWITZ l. c. p. 39.

lium, pori cauum dispendentium *u*), tumoris glandulosi, polyposi, excrescentialis, etc. *x*), parotidum intumescens *y*), interdum sequela est. Auditum in diuturna lue Gallica affectis substantia membranosa, e pori cauo quotidie decidente, quandoque turbari F. HOFFMANN *z*) asserit, ac simile quid viro, chronicum ante aurium fluxum passio, quotannis accidisse vidit SCHULZE *a*). Ab extravasato perinde quovis, purulento, sanguineo, etc., a peregrinis in aurem ilapsis, vermibus in aure praesentibus *b*), insectis ingressis, haec impervia subinde inducitur. Frequentissime interim a ceru-  
nine, ceu iusto tenuiore *c*), ceu, uti ple-

B 3

rum.

*u*) Ibid. p. 37.

*x*) Ibid.

*y*) HOFFMANN Diff. de aud. diff. §. 5.

*z*) Ibid. §. 7

*a*) Diff. de aud. diff. §. 6.

*b*) ACREL chirurg. Kranken-Geschicht, a. d. Schwed.

*c*) cf. cl. KRTOWITZ l. c. p. 40.

rumque evenit, spissiore quam par est imo lapideo, meatus auditorius obturatur *d)*, Lapidea haec ceruminis induratio cl. KRZOWITZ a diathesi corporis arthritica plerumque pendere videtur *e)*, id quod cum ceruminis ita petrificati cum arthriticorum tophis similitudo, tum et casus nonnulli, ubi hoc vitium symptomatibus arthriticis manifeste iunctum fuit ipsi probant.

Detegitur pori acustici imperuiatio:

1) Causae praegressae vel praesentis cognitione, e. g. corpore peregrino in aurem illapso, parotidum tumore etc.

2) Materiae obstruentis ex aure proventu, uti puris, aquae, ceruminis tenuioris, meatum implentis, effluxu; insectorum, vermium, exitu; leguminum in porum illapforum ex aure egerminatione *f)*.

3) In-

*d)* Ibid. p. 41. sq.

*e)* Ibid. p. 40.

*f)* Ibid. p. 186.



3) Inspectione in aurem, luci obversam, ac si necesse est dilatatam. Auris dilatationi speculum ab HILDANO g) descriptum inferuit.

4) Specillo auri immisso. Quod si offendat vtriamque; si minus ac par est in aurem descendat; aut in vnam altius descendat altera; si eductum fordibus inquinatum sit; heterogeni quid in poro adesse liquet.

5) Si poro acustico laesae auris arte obturato, auditus non euadit hebetior.

6) Si melius audit aeger ore hianse.

7) Si vocem propriam distincte percipit. Huius enim perceptio tubarum EVSTACHII ope imprimis fit, ac pori acustici obstructione vix imminui posse videtur, notante cl. SIMS h). Hinc etiam

8) Voce submissiore loqui solet eiusmodi aeger, cum e contrario surdi e tubae

B 4

bae

g) Obs. et cur. med. chir. cent. I. obs. 4.

h) Vid. merkw. Abhandl. d. Londn. medic. Gesellschaft. I. B. a. d. Engl. Altenb. 1789.

bae Eustachianae obstructione vocem in loquendo magis ac ante eleuant. Signa haec quatuor posteriora meatus auditorii imperuiationi ac myringis ad contremiscendum ineptitudini communia sunt. E soni enim per tubas EVSTACHII perceptione, cum, tubis, tympano, membranae fenestrae rotundae ac labyrinthi partibus, nil vitii inesse, innotescat; porum acusticum vel tympani membranam affecta esse necesse est. Nam ossiculorum ineptitudo sola, soni, meatum auditorium intrantis, ad labyrinthum propagationem impedire nequit i).

#### §. 12.

Eadem fere ratione, ac pori acustici imperuiatione fit, auditus laeditur, si myrinx soni impressione in motum tremulum non concitatur. In utroque enim casu tremores sonori, meatum ingredientes, interioribus auris non communicantur. Auditus imminuti causa proxima semper in huius

i) cf. §. 14.

ius membranae morbofo flatu quaerenda  
erit, fi poro acuftico fatis peruio:

1) Signa memorata (§. praeced. 5. 8)  
adfunt.

2) Si manu concaua vel tuba acuftica  
auri admota auditus euadit melior. His  
enim adminiculis vndae fonorae maiori vi  
myringi illidunt, membranamque ad con-  
tremiscendum cogunt.

3) Si auditus tantum imminutus eft  
non prorfus abolitus. Surditati enim pro-  
ducendae myringis ineptitudo fola non  
fufficere videtur k).

Bini omnino membranam hanc contre-  
miscendo ineptam reddere valent flatu:

I) Laxitas nimia, quam aeris violenta  
in myringem impulfio, tempore fragoris,  
fternutationis &c.; aurium manatio diu-  
turua; iniectionum oleoforum abufus l),  
caufare poteft, quamque e caufa praegreffa,  
myringi laxandae idonea; ex auditu diffi-  
ciliore tempeftate humida, meliore coelo

B 5

ficco,

k) KRZOWITZ l. c. p. 78. 79.

l) TIMAEI refponf. 46.



ficco, sereno; e leuamine mali post astringentia, augmento a relaxantium usu, dignoscimus.

II) Rigiditas praeternaturalis, quae induci potest siccitate auris nimia; intumescencia myringis inflammatoria, excrescencia *m*); myringis ossificatione *n*); pure, cerumine in membranae huius superficie indurato; materiae sebaceae, qua neonatorum myrinx obducta reperitur, quaeque postea cum cerumine euacuari solet, retentione. Bis hanc substantiam, membranae crassae, robustae ad instar myringi inhaerentem, in puerulorum surdorum anatome vidit FABRICIUS *o*), eamque cum cl. VALSALVA *p*) pro causa surditatis connatae ordinaria habet. Puellae meminit DRAAKE *q*), quae hac demum membrana post

*m*) Act. nat. cur. v. 1. obs. 223.

*n*) LÖSEKE obs. anat. chir. med. 2. p. 25. not. i.

*o*) De chirurg. operat. f. 39.

*p*) Tract. de aur. human. c. I. §. 13, p. 19, sq.

*q*) Anthropol. Book 4, ch. 12.

furditatem oclennem excidente, auditus  
vsum adepta est, ac simile quid in furdo  
mutoque ab ortu contigisse videtur, qui  
aetatis anno XXIVmo oborta suppuratione  
in vtrazque aure auditum recepit *r*). Diag-  
nosin huius status saepe difficillimam con-  
stituunt

1) Causae signa. Myringem nimia sic-  
citate laborare e ceruminis defectu aliisque  
id genus indiciis suspicari licet *s*). Cru-  
stam puris, ceruminis myringi inhaerere,  
vltus auris praegressum, neglecta auris pur-  
gatio, suspicionem aliquam mouet. Mem-  
branulae neonatorum in myringe retentio-  
nem furditas congenita quodammodo pro-  
dit. Intumescenciae myringis inflammato-  
riae, excrescentialis, metum, inflammatio,  
vltus auris, praegressa excitant.

2) Auditus melior coelo pluuioso, hu-  
mido, difficilior aere sicco.

§. 13.

*r*) Mem. de la acad. des sc. a. 1703.

*s*) cf. §. 19. III. 2.

Membranae tympani dilaceratio immediate nullam auditui inferre videtur noxam, quod casus complures, ubi, myringe manifeste peruia, imo prorsus destructa, auditus tamen nihilominus vel illaesus permansit, vel parum modo deprauatus fuit, probant *t*). Membranam fenestrae rotundae solam myringis deficientis hic expleuisse munus cl. SCARPA verosimillimum reddit *u*). Quamvis interea huius membranae destructione necessario non tollatur auditus, aeris tamen frigidioris, pulueris, aliarumque sordium libero iam ad interiora auris accessu, partibus organi internis ac auditui immedicabilem sensim adduci labem necesse est *x*), nisi vulnus membranae illatum iterum coalescat, ceu

*t*) Omnes fere observationes huc facientes collegit cl. KRZOWITZ l. c. pag. 52-64.

*u*) De fenestra rot. e. tymp. sec. in delect. opuscul. medic. Ital. cur. ROEMERO Vol. I. pag. 56. 57.

*x*) cf. cl. KRZOWITZ l. c.



ceu myringis destructae loco noua re-  
neretur. Vtrumque hoc naturae interdum  
perfici viribus cl. VALSALVAE euincunt ob-  
seruata y).

Myringis continuitatem solutam esse  
cognoscimus:

1) E causa praegressa, myringem de-  
struente.

2) Si specillum auri immissum iusto  
altius descendit.

3) Si fluidum auri immissum in fauces  
effluit.

4) Aer vel tabaci fumus sub expira-  
tione per meatum auditorium erumpit et  
flammulam ceu plumulam auri admotam  
mouet.

#### §. 14.

Officulorum causticorum catenula, my-  
ringis tremoribus ad labyrinthum propagan-  
dis inferuiens, triplici statu muneri hoc de-  
fungendo impar redditur:

#### I) Mala

y) cf. cl. MORGAGNI epist. anat. 13. n. 12.

I) Mala conformatione. Officula admodum exilia ac tertia parte minora solito, in aure pueri ab ortu furdi mutique reperit BAILLY *z*). Plane contrariam catenulae fabricam in aure quadam inuenit cl. COTVNNI *a*). Officula hic, imprimis stapes, duplo maiora erant consueto, membrana vero fenestrae rotundae integre ab osse clausa. Num hic, uti autumat cl. SCARPA *b*), basis stapedis duplo maior, quatuor minores fenestram oualem ascendentes duplo amplificarentur, membranae deficientis explebat munus?

II) Dissolutione, quae vitii connati *c*), ulceris cariosi, officula erodentis, auriscalpii profundius auri intrusi, forsan et aeris, violente per tubas EVSTACHII in myringam impacti, sequela esse potest. Sub hydroce-

*z*) In BONETO. l. c. §. 3.

*a*) De aquaeduct. §. 72.

*b*) l. c. §. 29.

*c*) In BONET. sep. anat. L. I. 5 - 19. obs. 4.

§. 1. 2.

drocephalo interno, teste ill. BEVMENBACH *d*),  
 diaphyses tres, quae totum os temporum  
 componunt, quandoque secedunt, quo fit,  
 ut ossiculorum catena diuellatur. Maileum  
 ac incudem plerumque hic cum parte  
 squammosa ossis temporum sursum actos  
 vidit ill. Vir; semel ipsum stapedem e fe-  
 nestra sua euulsum reperit.

Hinc fieri putat, cur nonnulli eius-  
 modi aegri, licet adultiores facti, surdi,  
 stolidique maneat, nonnullis vero auditus  
 illaesus persistet.

III) Immobilitate; quae resolutione  
 musculorum acnesticorum *e*); mucos, pure,  
 sanguine indurato, ossiculis inhaerente;  
 fortasse et ossiculorum luxatione, per ae-  
 rem impetuose myringi impactum; articu-  
 lationum catenulae anchylosi; ossificatione  
 interdum videtur induci.

In

*d*) Geschichte und Beschr. der Knochen des  
 menschl. Körp. pag. 140.

*e*) cf. §. 7.



In furdi cuiusdam aure causam mali in eo inuenit cl. VALSALVA *f)*; quod membrana fenestrae oualis, in substantiam osseam indurata, vnum continuatum os constituebat cum basi stapedis et margine fenestrae oualis, adeoque efficiebat ne amplius sursum deorsumue moueri posset.

Non necessario interim catenulae ineptitudine sola tolli videtur auditus. Myringe enim destructa quis esse potest ossiculorum usus? At in manifesta huius membranae destructione nihilominus haud raro perditur auditus. Canes quibus lacerata fuit myrinx, ossiculaque fracta *g)*, auditu tamen minime sunt orbati. Quid, quod teste RYOLANO *h)* surdus quidam tum demum auribus frui coepit, cum auriscalpio profunde in aurem demisso myringem sibi disruebat ossiculaque fregerat.

Ossi-

*f)* Tract. de aur. hum. c. 2. §. 10.

*g)* MORGAGNI epist. anat. 13. n. 12.

*h)* ENCHIR. anat. L. 4. c. 4.

Officulorum catenulam laesam esse for-  
 san suspicari licebit, si locum, vnde ad-  
 veniat sonus, percipere nequit aeger. In-  
 nuit hoc et VALSALVAE observatio i). E-  
 tribus enim canibus quibus myringes per-  
 forauerat, altera 50 circiter a membra-  
 narum perforatione diebus, cum cetera et-  
 iam tum bene exaudiret, id tantum noxae  
 coepit ostendere, vt vnde soni aduenirent,  
 non amplius videretur internoscere; nam  
 vocata saepe alio se conuertebat quam in  
 eam partem, vnde vocabatur. Interea  
 dein cane vterque malleus fractus reperie-  
 batur, myringe vtraque confanata, atque in  
 vna situs et color a natiuo abludens. In  
 reliquis canibus, quibus mallei erant illae-  
 si, nil eiusmodi deprehensum fuit. Cur  
 amen hoc symptoma non statim, sed 50 mo-  
 lemum a myringe pertusa die occepit, ac  
 post mensem iterum evanuit?

E catenulae singulis vitiis mala con-  
 formatio diagnosin nullam admittit.

Ca.  
 MORGAGNI l. c.



Catenulae dissolutionem causas praegressae vel praesentes, hoc vitio inducendo idoneae, vti iniuria externa, officulis illata; hydrocephalus; caries ossiculorum, quae ex otalgia praegressa et sanie cariosa, cum squammulis osseis per tubam Eustachii in fauces, vel porum acusticum prodeunte, cognoscimus, interdum prodent.

Catenulae quoque immobilitas e sola causae praegressae cognitione suspicari potest. Sic vulnus faciei, dentitio difficilis, resolutionis musculorum acusticorum metum excitant. A foridibus induratis catenulam immobilem reddi, extrauasi, in tympano cauea stagnantis, signa suspicari sinunt. Anchyloseos, ossificationis articulationum catenulae, aetas aegri proeclior, luxatio ossiculorum, sternutatio, narium emunctio valida, morbo praegressae, suspiciem nem mouent.

### §. 15.

Non infrequens perinde auditus immutatus causa in tubae Eustachianae imperui-

tion



tione confistit. Aer per canalem hunc tympani caueam ingrediens cum sonos ore exceptos, tum et tremorū myringis non exiguam partem fuscipit, ac per membranam fenestras rotundae labyrintho aduehit. Hinc in eius obstructione non modo soni suiuis in ore excitati sensus interit, sed sonorum quoque, meatum auditorium intrantium, perceptio minuitur. Hominem nouit. cl. VALSALVA, faucium ulcere in sinistrae tubae regione laborantem, cui, quoties mollem turundam in ulceris cauitatem intrudebat, auditus illico intercidit, statim vero rediit turunda ex ore remota <sup>k)</sup>).

E causis huius imperuiationis, omnium ere consensu frequentissima est refrigerium, c inde oriunda membranæ tubas inuestantis intumescencia inflammatoria. Tumores inflammatorii, suppuratorii, membranam faucium, quæ tubas quoque subit, afficientes, quales sub morbis anginosi interdum eueniunt, vel orificii tubalis compressione, vel ipso parietum tubæ coalitu,

C 2

idem

k) De aur. hum. c. 5. §. 10.

idem quandoque inducunt vitium. Vleeris denique faucium, imprimis venerei; mucipuris, ceu in tubae cauo, ceu ipsius modiorificio, indurati; crustae aphthosae, tubae orificio infidentis; polypi narium, in fauces penetrantis; non raro sequela est. Diagnosin eiusmodi obstructionis absoluunt sequentia:

1) Causae praegressae cognitio.

2) Exspirationis validae, ore naribusque clausis susceptae momento, molestum pressionis ac tensionis in myringe sensum — ab aere per tubas in myringem impulsu pendentem — non percipit aeger.

3) Tinnitus, susurri, aliusue sonitus extra aurem non existentis, sensu assiduus molestatur. Symptoma hoc aeri, in tympani cauea incluso, tribuendum esse, similis docet sonorum illusio, quam percipimus, si, meatu auditorio digitis obturato aeri in eius cauo contento exitum pracludimus.

4) Er



3º) Post remedium, quæ tubarum  
infarctum tollunt, vsum, fragor hic cum  
præfente plerumque obauditionis leuamine

n) cf. cl. VOGEL de cogn. et cur. praec. c.  
h. affect. §. 585.



oboritur o). Quum vero in nulla alia surditatis specie, quam quæna tubæ obstructione oritur, in aër in tympano inclusus esse possit, ubicunque hoc symptoma deprehenditur, ad tubarum Eustachii imperuiationem colligere licebit.

5) Vocem propriam non percipit aeger, vel obscurius ac antea. Surdo WATHENII ad primam iniectionem in tubam factam propriae vocis sensus illico rediit p). Una interim tuba adhuc peruia, fallere potest hoc signum.

6) Vocem in loquendo magis ac ante eleuat aeger.

7) Meatu auditorio arte obturato, qui adhuc superest auditus, plane intercidit. Alterutra interim tuba adhuc aperta hoc signum fallit.

§. 16. Medium quasi, in quo undae sonorae, tam per tubas Eustachii, quam in meatum

o) cf. cl. SIMS. l. c.

p) LESKE l. c.

auditorium aduenientes confluunt, vltius hinc ad labyrinthum propagandi, constituit tympani cauea. Hac vilo modo obstructa, ac imperuia, radii sonori vtraque via aurem intrantes ad neruum auditorium non pertingunt, sonique perceptio tollitur.

Plerumque haec obstructio humorum in tympani cauea accumulatione causatur, vti puris, muci, saniei, tempore suppurationis, inflammationis, cariei, in tympano praesentis. In febrium aliorumue morborum decursu, metastatice interdum humores serosi ad tympanum deponuntur, caueam opplentes. Sic in furda stri, apoplexia interemti, capite vtrumque tympanum aqua repletum vidit cl. MORGAGNI *q*). Surditates quae febribus superueniunt saepe coniunctas invenit cl. VALSALVA cum aqua vtroque in tympano redundante *r*). In oue surda tympani cauum ac tota tuba Eustachii ex-

C 4

cres-

*q*) Epist. anat. 7. n. 6.

*r*) Ibid.



crefcentiis repleta reperiébantur<sup>s)</sup>). Quandoque membranae praeternaturales per tympani et cellularum mastoidearum in caueas disperfae, has imperuias reddunt, quod in binis furdis obseruauit MORGAGNI<sup>t)</sup>).

Tympani obstructionem frequenter tubae Eustachianae imperuiatione iunctam esse, verosimillimum est. Praeterea enim, quod causae tympanum obstruentes, i. e. g. membranae huius caueae suppuratio, et excrefcentiae ex eadem enatae, tubam quoque, quam eiusdem membranae continuationem uelut, simul interdum inferciant; vnius etiam horum cautorum obstructio idem alteri inducere valet vitium. Tuba enim imperuia, monente RIOLANO<sup>u)</sup>), humores in tympano secreti, vel eo delati, exitum nusquam inuenientes, ibi accumulentur. necesse est; et contra si tympanum extrauafato ali-

<sup>s)</sup> Act. nat. cur. Vol. I. obs. 223.

<sup>t)</sup> Epist. anat. 5. n. 26.

<sup>u)</sup> Animadv. in theatr. Bauhin. p. 243.



quo oppletum fuerit, facillime hoc tubam  
quoque obstruet.

Diagnos. tympani imperuii pro causae  
obstruentis diuersitate varia est.

Extrausatum aliquod in cauea hac flag-  
nare colligitur:

1) E causae praegressae cognitione, in-  
flammatione e. g. auris internae, quae in  
suppurationem abiit, cariei in tympano si-  
gnis etc.

2) E tensionis, grauitatis, fluctuationis  
in tympano sensu, notante BYSSONO x).

3) E materiae stagnantis in fauces ef-  
fluxu. Feminae a fluoris albi subsistentia  
surdastrae, quoties caput inclinaret, come-  
deret, humor acris et falsus linguam pete-  
bat y). Alius, per multos iam annos ba-  
ryecoia graui, cum ichoris foetidi ex aure  
effluxu, quouis hyeme redeunte laborans,  
molestum simul summis in faucibus gustu  
C 15 odora-

x) cf. HALLERI disputat. chir. select. T. II.  
n. 44.

y) Ephem. Germ. dec. II. a. 7. p. 171.

odoratuque saepe percepit sensum, eamque ibi titillationem, ut salivae flavescentis insignis copia ex ore proflueret x).

4) Si fluidum per processum mastoideum in tympani cavam injectum, sordibus inquinatum redit.

A membranulis praeternaturalibus cavam interrumpi tum suspicari potest, si iniectione per processum mastoideum facta, in fauces non penetrat fluidum, sed ex apertura nova illico iterum refluit.

Excrementiarum in tympano praesentium cariei in tympano indicia, uti sanies in fauces effluens etc. metum ciere possunt. Myringe simul erosa specillum ac inspectio in aurem eas detegit.

§. 17.

Summae dignitatis ac ad auditus integritatem necessitatis pars membrana fenestrae rotundae est a).

Oscillationes sonoras,

x) Act. n. cur. V. I. o. 223.

a) cf. cl. SCARPA l. c. (ad §. 13.).



ras, aeris in tympani cauo hospitanti im-  
partitas, membrana haec suscipit, et pro-  
prioque tremore auctas in labyrinthum  
transmittit. Meatus perinde auditorior *b)*,  
myringae *c)* ac ossiculorum catenula *d)*,  
sonis excipiendis ineptis, vnice interdum  
harum partium explere valet munera.

Alterationum interim huius membranae  
morbosarum, myringis morbis forsan haud  
dissimilium, natura ac diagnosi hactenus  
in obscuro latent.

#### §. 18.

Partes sono exipiendo et ad intima au-  
ris propagando iunctas cum organo sonum  
sentiente ipso proxime nectitur labyrinthus  
auris, quem vestibuli cochleae ac canalium  
femicircularium caueae componunt. Com-  
posita haec ac fabricae artificio admirabilis  
cauitas tenerrimas recipit portionis mollis  
nerui

*b)* vid. infra §. 29.

*c)* Vid. §. 30.

*d)* Vid. §. 14.



nerui auditorii expansiones, quibus per aquulam, omne labyrinthi cauum explentem); tremores sonori communicantur. Immediatum itaque, quod machinam auris cum nervo auditorio iungit, tollitur vinculum; caeca hac, aliqua sui parte, imperuia existente, eoque irreparabilius eiusmodi status auditui inducit damnum, cum molli simul, quam labyrinthus continet, nervosae pulpaе immedicabilem plerumque inferat labem.

Sordium spissarum in labyrinthi caueis accumulatio, quam in aurium anatome subinde observari, ac membranarum labyrinthi inflammatione induci affirmat el. VERNÉY *f*); parietum labyrinthi ossearum intumescencia venerea, scrophulosa, etc.; puris, saniei in labyrinthi cauo aggestio, tempore suppurationis, cariei, interiora auris

e) Cf. ill. WRISBERGII not. 132. ad A. HALLERI p. l. physiol.

f) De org. aud. p. 3.

ris occupantis; huic imperuiationi imprimis  
ansam praebere valent.

Diagnosim interim eiusmodi flatus, diffi-  
cillima ac saepe impossibilis erit, et vnice  
e causae surditati praegressae signis petenda.

Humoribus spissis cauea dicta repleti  
ex inflammatione auris internae, quam in-  
sequebatur surditas, quodammodo potest  
suspiciari.

Ossium labyrinthi intumescenciae vene-  
reae, scrophulosae etc. suspicionem surdi-  
tas, sublata lue, sanatis scrophulis perdu-  
rans, mouet.

Caries labyrinthi semper metuenda erit,  
vbi suppurationis, cariei in tympani cauo  
apparent indicia, ac dolore simul fixo, ro-  
dente, in intima organi parte cruciatur  
aeger.

#### §. 19.

Quodsi partium, machinae auris adnu-  
merandarum vitio tribui nequit auditus lae-  
sio, ac supra memorata g) indicia adsunt,  
in

g) Diff. de aud. diff. §. 12.



in statu morboſo nerui auditorii cauſa proxima morbi quaerenda eſt.

Praecipui huius nerui ſtatus, quibus ſoni impreſſioni ſentiendae ineptus euadit, ſequentes imprimis eſſe videntur.

I) Deſtructio quae ſub carie, ſuppuratione in labyrintho euenire poteſt, cuiusque metum dolores fixi ac rodentes in intima organi parte &c. excitant.

II) Atrophia, qualem ſtatum ſigno quidam nullo detegendum in neruo auditorio ac optico dextro canis ſurdaſtri ac vno oculo capti inuenit F. HOFFMANN h).

III) Siccitas nimia, quam aquulae, neruoſam labyrinthi pulpam irrorantis, ſubſiſtens ſecretio proxime inducit. — In ſurdi cuiusdam capite cauſam ſurditatis in nerui auditorii vtriuſque lateris exſiccatione inuenit cl. ARENDS i). Eiuſmodi quoque vitio laboraſſe videtur RIVINI puer, cui poſt vini potum narium excretio ſubſtitit auditus.

h) Diff. d. a. d. §. 12.

i) De cephalalgia.



Diagnosin huius flatus conformant:

1) Causae furditati praegressae, aurem  
solam vel corpus vniuersum exsiccantes.

2) Siccitatis signa in aure ac toto corpore obuia; vti ceruminis defectus, nasi insolita siccitas, excretionum omnium paucitas, habitus corporis ficcior etc.

3) Auditus melior tempestate humida,  
deterior aere sicco, calido.

4) Iu-

k) Diff. cit. p. 23.

1) Colleg. cas. magn.

4) Inuamen a humedantibus, exsic-  
cantium noxa.

IV) Compressio, quam extrauulata, tu-  
mores neruum auditorium vel in ortu suo,  
ceu progressu intra labyrinthum prementia,  
intumescencia ossium labyrinthi, saepissime  
vero sanguinis in auris vasis accumulatio,  
producunt. Neruum tumore, extrauulato  
aliquo, ossium intumescencia compressum  
esse, diiudicatu plerumque impossibile erit.

Compressionem a sanguinis congestione  
ortam indicant sequentia:

1) Causa sanguinem ad caput com-  
pellens *m*). morbo ansam dedit, imprimis  
in plethorico.

2) Congestionis sanguineae in aure ac  
capite apparent signa, vti pulsationis in  
aure sensus, capite imprimis inclinato *n*),  
vertigo, cephalalgia, rubor faciei etc.

3) Augmentum morbi periodicum. Sic  
quibus a mensium, haemorrhoidum subsi-  
stentia,

*m*) Vid. §. 4.

*n*) cf. ill. VERNEY l. caput 3o. §. 10.



stentia, venaesectione omissa, auditus laesus est, eo tempore augeri solet malum, ubi fluxus redire, venaesectione institui debuisse. Qui auditus grauitati a sanguinis congestione ad caput obnoxii sunt, eius exacerbationem experiuntur vere et autumnus, quo tempore humores magis moueri, congestiones augeri solent o).

4) Adiuuantia, ac nocentia. Noui virum, a capitis commotione diu iam grauer auditum, cui cubiculum calefactum ingredienti auditus statim plane perit, idemque accidit post leuissimum quoduis pedum refrigerium.

V) Languor praeternaturalis, cui auditus laesio tribuenda esse videtur:

1) Si causa debilitans malum induxit, vel surditas, a vasorum auris nimia impletione orta, hac licet sublata, perdurat.

2) Si melius audit aeger post pastum sumptoque vino, melius ubi plures simul vndae

o) Diff. cit. §. 12.



vndae sonorae aurem intrant, aure v. g. propius ad sonum admoto, ore hianter manu concaua auri adnota etc.

3) Si strepitus, per aera, tympana campanas etc. excitati, momento, omnia id tempus percipit aeger, hoc vero silentio iterum furdus euadit *p*). — Symptoma hoc myringis nimis flaccidae signum plerique esse putant, membranam hanc sub tali sonitu ad debitam tensionem cogi, mune-rique suo aptam reddi censentes. Quod vero modo talis sonitus myringem ita in tremores concitare posset, vt sonos longius minores, e. g. mussitantium verba, simul eo tempore percipiat aeger? Qua ratione perstantem auditus restitutionem efficere eiusmodi fragor, magis, vt videtur, myringi laxandae, quam eidem tendendae idoneus? Probabilius ex eius praesentia a nerui auditorii atoniam concluditur. Si quoque coecitatem, a nerui optici paraly-  
ortam, lucis validae impressio quandoqu-  
fana

sanat. Semel perinde sordiditatem, eiusmodi phaenomeno iunctam, iniectione irritante (ex infuso ror. mar. et cortic. salic.) in tympani caueam facta sustulit cl. FIELITZ *q*).

4) Remedia excitantia auditum emendant, sedantia vero nocent.

VI) Sensibilitas nimia, quae quantum audiendi negotium turbare valeat, sequens locet F. HOFFMANNI observatio *r*). Viro, vertigini ac ceruicis dolori obnoxio, post insultum spasticum, sinistram imprimis capitis partem afficientem, grauissima successit obauditio, laeuae praesertim auris.

Huic sub dio auditus fuit liberior quam in conclauis, et in fornicatis locis grauior eu plane nullus: facillimus contra si auncto sonoro aliquantum remotior superiorem auris dextrae regionem a capite paulum reclinaret. Quodsi iuxta horologium pendulum constitit, pulsus eius non udiit, nisi ubi ad 4 - 5 gressus recedens

D. 2 au-

*q*) Vid. §. 42. n. 4.

*r*) Cons. et resp. med. cent. I. cas. 40.

aurem modo dicto leuaret. Surdi memin-  
cl. WATHEN s), cui inter visionum spe-  
ctra varii coloris auditus interierat, qui ta-  
men iniectionibus per tubam Eustachii  
saepe repetitis, aliquantum emendabatur. A-  
soni intensiores, qui prius ad colloquen-  
dum erant necessarii, nunc ipsi fuerunt  
molesti, ac ingrata et dolorosa in auribus  
excitarunt sensationem. Idem in propria  
voce ipsi accidit, nec sua aliorumque verba  
audire potuit, nisi longe submissiora, quam  
ante fuerat necessarium. In conclaui tran-  
quillo mediocrem vocem in colloquio sine  
molestia percepit. Similis forsan nervi au-  
ditorii status in muliere quoque obtinuit,  
quae e refrigerio surda assiduo simul auris  
culae motu conuulsiuo molestabatur t).

Neruum auditorium eiusmodi statu le-  
borare innotescet:

1) E causa praegressa irritante, v.  
acrimoniae ad interiora auris metastasi, re-  
frigerio etc. in corpore irritabili.

s) l. c.

t) cf. ill. LESKE l. c.



2) E phaenomenis cum surditate con-  
unctis, vti soni intolerantia, auriculæ motu  
convulsiuo, spectris visionum, sonorum ex-  
tra aurem non existentium sensu etc. audi-  
tus grauitatem interdum comitante.

3) Si melius audit aeger a corpore  
sonoro remotus, quam eidem adstans, ac  
humiliores sonos melius percipit, quam in-  
tensiores.

4) Ex anodynorum vsu, irritantium  
vero noxa.

§. 20.

Laesionum, quibus auditus organon ob-  
noxium est tam variarum diagnosis plerum-  
que difficillima; tenerrima partium eius  
praecipuarum fabrica, qua fit vt leuiores  
quoque causae immedicabilem saepe illis  
inferant labem; difficultates denique in re-  
mediorum ad partem laesam ipsam appli-  
catione immediata, obuia, haud raro in-  
superabiles; minime laetam in genere red-  
dunt auditus difficultatis prognosin. Hanc  
interim, pro causae occasionalis, partis af-

fectae, ac laesionis modi varietate, pro morbi denique complicatione varia, admodum diuersam esse, necesse est. Horum itaque omnium prius habita ratione, quid in casu quouis singulo timendum sit aut sperandum, facile poterit diiudicari.

## SECTIO II.

### *Auditus difficultatis curatio.*

#### §. 21.

Auditus imminutus, vel abolitus binis omnino restitui potest methodis:

1) Causae occasionalis cognitae remotione. Quae si non apparet, vel si ea sublata nihilominus perdurat malum, tum

2) Vitium causa occasionali auditus organis inductum, vel causa morbi proxima tolli debet.

## §. 22.

Vbicunque a causis, quae sanguinem in auris vel capitis vasis accumulunt, pendet auditus segnities.

1<sup>mo</sup>) Vasa impleta nimis depleri debent, tumque

2<sup>do</sup>) Vasis relaxatis, si opus est, robur pristinum restitui.

Priori indicationi satisfacit tota euacuantium ac derivantium classis, et inter haec imprimis sanguinis missiones. A venaesectione itaque larga, in pede vel brachio instituta; ac vbi necesse est saepius repetita, cura incipietur, quae sola quandoque morbo profligando suffecit *u*). Surditates, quae febribus superueniunt, sanguinis e naribus profluuium interdum tolli, HIPPOCRATES *x*) et cl. STOLLE *y*) testantur, Vbi a venaesectione, certo anni

D 4

tem-

*u*) Ephem. Germ. Dec. I. a. I. obs. 101.

*x*) Coac. n. 147. 195. 210.

*y*) Rat. med. t. 6. p. 16.



tempore institui solita, neglecta pendet ob-  
 auditio, eodem tempore ac loco, quo an-  
 te, venam secare conueniet. Plerumque  
 interim V. S.nes quoque topicae in auxi-  
 lium vocandae erunt, vti scarificationes ca-  
 pitis z), hirudines, cucurbitae, auris re-  
 gioni, vel si a mensium, haemorrhoidum  
 fluxu suppresso oritur surditas, perinaeo,  
 ossi sacro etc. affixae. Vomitoria perinde,  
 larga dosi propinata, purgantia fortia, ac  
 iustis ex interuallis repetita a), magnam  
 hic saepe praestant opem. Puella, quae  
 post lapsum se scala in caput auditus ac lo-  
 quelaе amiserat vsus, excitata emesi co-  
 piofa, ortoque simul sanguinis largo e va-  
 gina profluuiio, inter haec, septimo morbi  
 anno surda mutaue esse desiit b). — Re-  
 media denique, quae humores ab aure de-  
 riuant, vti masticatoria, gargarisationes, e  
 rebus stimulantibus; mercurius, vsque ad  
 sali-

z) KRZOWITZ l. c. p. 105.

a) SCHVLZE diff. c.

b) cf. ill. RICHTERI chir. Bibl. 9. B. 3 St.

saluationem modicam exhibitus *c*); vlcera artificialia *d*); ac similia non mediocrem saepe in hac auditus imminuti specie exferent vim, eoque maiorem, quo magis diactam simul tenuem ac deplentem sub cura seruat aeger. Hac fere sola viro, a summa totius corporis plethora ac succorum abundantia grauitur audienti, breui auditum restituit F. HOFFMANN *e*).

His remediis rite ac satis diu adhibitis, vbi non redit auditus, vel reuersus breui post iterum intercidit, vasorum auris atoniam, qua fit, vt humores ab aure derivati, quauis occasione solita loca denuo petant, suspicare licebit.

Hanc solam quandoque morbum alere posse, casus supra allati *f*) confirmant. Fomentationes auris regionis, gargarisationes, iniectiones auri, frigidae, amissum forsan in eiusmodi casu vasis restituent robur.

D 5

§. 23.

*c*) KRZOWITZ p. 115-118.

*d*) Ibid. pag. 147-156.

*e*) Med. rat. syst. T. 4. p. 4. c. 6. obs. 4.

*f*) Vid. supra §. 2. n. 1.

## §. 23.

Quae e causis debilitantibus emanat auditus difficultas, vel virium languoris universi symptoma est, vel causae aurem solum debilitantis sequela. In priore casu diæta roborans, cortex Peruvianus, martialia etc. adhibitis simul, si opus est, excitantibus topicis *g*), auditum plerumque restituent. Sic e febre acuta convalescentes surdastros fere omnes diætae reficientis ope sanatos fuisse STÖERCKIVS *h*) refert. In posteriore casu roborantia topica, vti iniectiones auri, gargarisationes irritantes, rubefacientia auris regioni adplicata, litus stimulant in auris vicinia infricati, similiaque conveniunt, sublata ante, vbi necessarium videtur, vasorum auris nimia impletionem.

## §. 24.

Quodsi partis, nexu consensuali cum aure iunctae laesio, aliquam auditui infert

no.

*g*) Vid. §. 42.

*h*) Ann. med. 1. Jul. p. 7.



noxam, medelae modo haec primum remouenda est, laesionis indoli variae respondente.

Vbi in abdomine surditatis causa latet, vel solae colluuiei primarum viarum tribuenda est, vel acrimoniis, quae abdominis visceribus firmitus inhaerent, eaque obstruunt. Prius siueueniat, emetica ac cathartica malo profligando saepius sufficient. Vomitu ac deiectionibus biliosis surditatem interdum solui, affirmat HIPPOCRATES *i)*, id quod etiam cl. STORCHIO *k)* in grvida obseruare contigit.

Posterior vero status medicamina exposcit, quae viscerum infarctus soluunt, materiam obstruentem sensim ad intestina determinant ac educunt, debilitatisque tandem visceribus robur pristinum restaurant.

Quae vulnera faciei quandoque insequitur auditus laesio, euitari posse videtur, si

*i)* Aphor. Sect. 4. aph. 28. - Coac. II. 208. 210.

*k)* Obs. clin. a. 6. p. 334.

per reunionem statim confanatur vulnus, vel saltem cicatricis amplae ac profundae genesis praepeditur. Morbum praesentem eadem forsan, qua coecitas eiusmodi vulnere causata, quandoque sublata fuit, incela tollet: vnguenti nempe emollientis in vulnus cicatrifatum infricatio valida, quae fortasse nerui laesi ac cicatrice distorti nimiam tensionem auferet. Similem frictioni effectum hic exseruisse videtur electricitas, qua aegro suo 1) auditum feliciter restituit cl. LINDHULT. Inde si nil obtentum sit, a nerui laesi percussione, vsque ad os facta, forsan aliquid expectari poterit.

Vbi tumoris, extrauasati, aliusue vitii localis cerebri sequela est surditas, his, quatenus fieri licet, auxiliis chirurgicis occurrendum est.

Auditus difficultatis, a materiae alicuius morbosae ad aurem metastasi causatae, cura, acrimoniae auditus organis incumben-  
tis ab aure auocationem primo loco requirit,

1) l. c. ad §. 7.

rit, pro acrimoniae varia indole, vario modo administrandam.

Causarum denique ultimae classis, quae nempe partium auris fabricam immediate violant, tractatio, sub laesionum, quas auditus organis inducunt, curatione, in sequentibus enarretur.

#### §. 25.

Interdum causa occasionalis vel prorsus incognita manet, vel ea licet remota auditus difficultas perdurat. In utroque casu unica restitutionis spes in laesionum auris organis inductarum medela consistit, ad diversam vitii, quo labefactatur auditus, indolem adaptanda.

#### §. 26.

Quando auriculae externae defectus aliquam auditui inducat noxam, auricula e conglutinata papyro, vel corio confecta ac in deperditae locum annexa, suadente DOLAEQ m), vel tubae acusticae, a cl.

DE.

m) Encyclop. chir. rat. L. I. c. 14. §. 19.



DECKERO descriptae *n*), usus huius partis iacturam quodammodo supplebit.

§. 27. *n*.)

Meatus auditorii obstructio, ad materiae obstruentis naturam diversam, variis tollitur adminiculis.

Quodsi primae conformationis vitio, ulcere praegresso, carne hic canalis occlusus est, operatione chirurgica *p*) sola referari poterit. Aegri itaque capite suffulto, aureque luci obversa, cum cultello paruo acuto, in locum orificii meatus auditorii, sufficientis magnitudinis incisio fiat, quae dein minutis sectionibus tam diu dilatetur, donec massa prorsus dissecta est, vel carne altius descendente, myringis lacerandae periculum oritur. Turunda nunc, cuius crassities in primis diebus sensim augetur, vulneri inditur, usque ad labiorum eius cicatrificationem ibi seruanda, ita tamen ut

puris

*m*) Vid. §. 30. in fine.

*p*) Cf. ill. Bell. Lehrbegr. der Wundarzney-Kunst. 3. B. p. 96.

puris ac fordium eluendarum gratia quotidie eximetur. Optime instituitur operatio, quando loqui incipit infans; prius enim eae sustinendae impar esset, ac serius loquelaе usum nimis fero condisceret. Similis operatio tum quoque locum habet, quando membrana praeternaturalis pori cavum occludit. Hac nempe cruciatim incisa, turunda vulneri inditur, ac donec eius labia occaluerint, ibi servatur. Carne interim, vel membrana myringi ita contigua, ut eius laedendae metus oriatur, securius erit ab operatione hac abstinere.

Polypi, meatus auditorii cavum implentes, si eius tantum orificio insident, cultelli aut forficis ope commode abscinduntur. Quod ubi ob radicis polypi situm, myringi vicinum, fieri nequit, vel deligandi sunt, vel, si ad polypi radicem immitti nequit filum, forcipe euellendi. Excrecentiae carnosae, fungosae, si meatus orificium tantum obledunt ferro candente, vel causticis destrui possunt. Quodsi vero  
horum

horum vsum myringis laedendae periculum impediatur, monente cl. BELL *p*), turundis, quarum sequens quaeque aliquantum crassior sit praecedenti, poro insertis, (veluti in vrethrae coarctatione fit) eius cavum sensim dilatandum est.

Glandularum meatus auditorii, parotidum intumescencia ubi eius cavum occluditur, tumore per apta remedia discusso, hoc iterum referetur. Squammulae in diuturna lue Gallica affectis porum acusticum quandoque obstruentes, auriscalpio ex eo exiiri vel iniectione elui possunt.

### §. 28.

Quando corpore peregrino aliquo canalis obstruitur, omnis cura in cita heterogenei exemptione versatur, in cauo interim tam flexuoso, ac prorsus fere indilatabili, saepe difficillima.

Quando corpus peregrinum ita porum claudit, ut intersitium adhuc aliquod inter se ac meatus auditorii parietes admittat,

*p*) l. c.



tat, duplici via ex aure eliminari potest:  
Nempe

1<sup>mo</sup>) Instrumentis, vel pone corpus,  
vel ad eius latera applicatis, quorum ope  
id eliditur (ceu protrahitur. Priorem in fi-  
nem adhiberi potest cochlear auriculare,  
quod commendat HILDANVS *q*), et cui  
simile instrumentum cl. BELL ad pisa aliaue  
rotunda corpora eximenda delineavit *r*).  
HAMVLS quoque paullulum incurvatus CEL-  
SI *r*) vel tenaculum HEISTERI *t*) idem  
præstabunt. — Corpori protrahendo infer-  
vit vossella parva, qualem cl. BELL *u*) de-  
scribit, qua corpus prehensum facili nego-  
cio educitur.

2<sup>do</sup>) Iniectione siphonis ope in inea-  
um facta. Huius ope minoris voluminis  
cor-

*q*) l. c. ad §. 11. II. 3.

*r*) l. c.

*s*) L. 6. cap. 7. art. 7.

*t*) Chir. P. II. c. 63.

*u*) l. c.

corpora, vti grana, insecta, vermes etc., commode eluuntur. In insectis, vermibus eliminandis, eiusmodi eligatur fluidum, quod eos simul enecat. Viua enim canalis parietibus adhaerent, ac difficiliter euocantur. Corporibus, quae firmiter meatui inhaerent, educendis, minime apta videtur iniectionis. Violentius enim instituta vel myringam laedet, vel in meatum altius intrudet massam, minus vero impetuose suscepta, heterogeneo excutiendo non sufficiet.

In eo casu, vbi meatum auditorium exacte implet corpus, nec memoratis methodis educi potest:

Imo) Massam frustatim eximere tentamus, emollitam ante iniectione emolliente vel si fragilis est, vossellae ope fractam aut cultello vaginato diuisam x). Haec vbi non admittit heterogenei indoles durior

2<sup>do</sup>) succussio auris, quam CELSVS y) sua

x) HEISTER l. c. - F. HOFFMANN diss. de aud. diff. §. 23.

y) loc. cit.

adet, eius egressum forsân efficiet. "Tabula inquit collocatur media, inhaerens capitibus vtrinq̃ue pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cuius auris eo modo laborat, sic vt extra tabulam non emineat: tum malleo caput tabulae quod a pedibus est, feritur, atque ita concussa aure, id quod inest excidit". Eodem scopo hic etiam adhiberi possunt

30) Ptarmica. Myrinx enim sub ster-  
tationis nisu in porum acusticum pro-  
lata, heterogeneum, vel immediate, si  
yringi fuerit contiguum, vel aeris, intra  
rp̃us ac myringem inclusi, ope loco  
ouet ac foras eiicit. Bina eiusmodi ex-  
empla adferunt F. HOFFMANN 2) ac SCHELL-  
ASS 3). Olei blandi in meatum instilla-  
re, interdum quoque membranae porum  
restituentis scarificatio, (si nempe mem-  
branae tumor inflammatorius illapsi egres-

E 2 sum

2) l. c. §. 8.

3) Diff. de aur. affect. p. 18.



sum praepediat) exemptionem quandoque  
valde leuabunt.

Quodsi memoratis hactenus auxiliis locum  
moueri ac educi nequit illapsum, a suppuratione  
sola, quam corpus diutius in meatu  
retentum ciet, quaeque iniectionibus ap-  
promoueri posset, eius solutio expectanda  
esse videtur. Terebelli enim in eiusmodi  
casu ab HILDBANO *b)* laudati, uti et incisionem  
pori acustici, ab AEGINETA *c)* et  
ALBVCASTO *d)* propositam, tanquam inutilem  
et noxiam operationes iure reiecit cl. KRZ-  
WITZ *e)*.

Cerumen in meatu auditorio aggestum  
eumque obstruens, si liquidius est, cochlearis  
ope statim eximi potest. Induratum  
vero ac petrificatum menstruis idoneis prius  
emolliri ac solui debet. Hoc scopo  
primis sese commendat aqua communis

*b)* loc. cit.

*c)* L. 6. c. 24.

*d)* Chir. tract. 2. c. 6.

*e)* l. c. p. 182. sq.

ida, quam el. HAYGARTH *f*) omnium ce-  
 uminis menstruorum efficacissimum inue-  
 nit, quaeque omnia ad cerumen soluendum  
 variis laudata remedia, vti aquas mine-  
 ales, solutiones saponaceas, salinas, ele-  
 tricitatem *g*), superflua reddere videtur.

### §. 29.

In meatus auditorii obstructione im-  
 medicabili, usus machinae, tremores sono-  
 rosos maiori copia per tubas EUSTACHII in  
 tympani caueam inuehentis, canalis imper-  
 ii defectum quandoque supplere valet.  
 Optime huic scopo inseruit tuba acustica,  
 cuius orificium angustius ori inserit aeger,  
 amplius vero loquentis labiis, ceu corpori  
 ananti applicat. Sic surdae meminit  
 ACHSIUS *gg*), quae cornu ori indito ro-  
 abat, vt collocuturi prominenti eius orifi-

E 3

cio

*f*) Med. Bem. u. Unterf. e. Gesellsch. v.  
 Aerzt. in Lond. 4. B. p. 168.

*g*) cf. §. 42. 9. d.

*gg*) Misc. nat. cur. Vec. 1. ann. 1. obs. 35.  
 schol.



cio voces in os inspirarent, ut quas ipsa  
sic audiret.

§. 30.

Auditus e myringis labe laesi restitutio  
medelam exposcit, statui, quo contremi-  
scendo inepta euasit, respondentem.

Vbi myringis nimis laxae apparent in-  
dicia: 1<sup>mo</sup>) Omnia remouenda sunt, quae  
ad statum hunc sustinendum et augendum  
aliquid faciunt. Sic vbi nimia humiditate  
auris laborat, remediis aptis humorum af-  
fluxus ad aurem minuatur, auris ipsa ma-  
gis exsiccetur, quem in finem moschum  
cum bombace auri inditum impense lau-  
dat FORESTVS *h*). Loca praeterea humida  
fugiat aeger, a potu nimio, calido impri-  
mis abstineat, soni validi impressiones,  
sternutationem, tussim, risum etc. euitet  
ac voce submissa in loquendo vtatur.

2<sup>do</sup>) Membranae flaccidae robur amis-  
sum restituendum est. Fumigationes auris

vola-

*h*) Obs. et cur. med. L. 12, obs. 15.



volatiles *i*), liquores acustici astringentes ac irritantes *k*), auri instillatae, hoc imprimis praestabunt. — Myringis nimia rigiditas, si tumoris inflammatorii, excrescentialis, membranam incrassantis, ossificationis, sequela est, curam nullam admittere videtur. — Quando vero siccitate nimia contremiscendo impar est, remedia quae membranam humectant ac ceruminis secretionem adaugent, uti olei blandi cuiusvis, lactis tepidae guttulae quaedam, auri saepius instillatae, saponis mollioris frustulum, auri aliquamdiu inditum, mixtela e galbano, oleo, et succo coepae, quam eadem ratione adhibere suadet cl. BELL *l*), forsan et electricitas, auditum saepius restituent. Crusta puris, ceruminis, myringem obducens iniectiones requirit emollientes, quae materiam impactam fundunt ac ex aure eluunt.

E 4

Simile

*i*) V. §. 42. 5.

*k*) Ibid. n. 6.

*l*) l. c.

Simile curationis genus et tum quandoque sufficiet, quando materiae sebaceae, neonatorum myringem obducuntis, retentio, auditum vitare videtur. Quo si nil obtentum sit, ab electricitate forsitan, quae non ceruminis modo, quam efficit secretionem adaucta *m*), sed myringis simul concussionem, cuticulae separationem adiuuare posset, multum poterit expectari. Eximia saltem huius remedii in surditate connata efficacia *n*) hoc probabile reddit.

Myringem vulneratam, vel quouis modo dissolutam naturae subinde consanari viribus, cl. VALSALVAE exempla probant. Quodsi interim non coaluerit vulnus, tuba acustica in caui sui parte membrana elastica instructa, qualem confecit cl. TRUCHET *o*), non myringis modo defectum

sup-

*m*) Vid. §. 42. u. 9. d.

*n*) cf. cl. KÜHN Gesch. d. med. u. phys. Electricit. 2. B. p. 146. sq.

*o*) Annal. Wratisl. Tent. 4. a. 1718. Apr. Cl. 5. art. 1. §. 2.

supplebit, sed foridum etiam ac aeris frigidioris in aurem ingressum impiediet.

Similis instrumenti, vel tubae acusticae a cl. DECKERO, NUCKIOQUE *p*) propositae, vsus, in auditus segnitie, a myringe vel nimis laxa, ceu rigida orta, non medioere praestabit commodum. — Quodsi omnem contremiscendi vim amisit membrana, eiusmodi machinam, modo supra descripto *q*), ori indat aeger,

### §. 31.

Ex ossiculorum acusticorum vitiis, mala catenulae conformatio, ac dissolutio artis auxilia respuunt. Catenulae immobilitas, a musculorum acusticorum paralyfi orta, medelam supra *r*) descriptam; quae vero a materiis in catenula induratis pendet, iniectiones in tympani caveam, requirit.

Vbi luxationis ossiculorum, ossificationis, anchyloseos, articulationum catenulae,

E. 5

ali-

*p*) cf. HEISTERI chir. P. 2, c. 66.

*q*) Vid. §. 29.

*r*) Vid. §. 24.



aliqua oriatur suspicio, eo forsan, cuius  
 Rolfincius meminit, methodo mobilitas ca-  
 tenulae restitui poterit. "Luxatio,, inquit  
 „horum ossium, si accidat, auditui ea offi-  
 „cit, nec restitui potest, nisi spiritus reten-  
 „tione. Nempe retento anhelitu, per mea-  
 „tum ori et auri communem, aer con-  
 „cham ingreditur, *αἰσρωε* cum impetu con-  
 „fertim, et dilocata reponit,, s). Sequens  
 etiam, quam HANNEMANUS t) describit,  
 in eiusmodi metu utilis esse posset curatio.  
 "Chirurgus,, ait "aliquos surdos curavit hac  
 „methodo; alte inserit fistulam tabaci, et  
 „quidem eius partem subtiliorem, in auri  
 „cavitatem; tunc vehementissima suctione  
 „ori admouens alteram fistulae partem cras-  
 „siorem suxit; aegri hac suctione percepe-  
 „runt aliquid doloris in aure, ast hac me-  
 „thodo curati sunt, audiendique facultas  
 „restituta est,,

§. 32.

s) Diff. anat. L. 2. c. 15.

t) Misc. nat. cur. Dec. 2. a. 6. obs. 123.

## §. 32.

Surditas, quam tubae EUSTACHIANAE imperuiatio efficit, nec causa occasionali sublata cessat, canalıs imperuii refertione curatur, quam variis, pro obstructionis gradu leuiori vel maiori, ac materiae obstruenris diuersitate adsequimur admiculis.

Quando mucos concreto, crusta puris, aphthosa, aliaue id genus materia, tubae tantum orificium clauditur, canali referando quandoque sufficient:

I) Faucium motus repetiti sub deglutitionis, vomituritionis, gargarisationis conatu, oscitatione, scretu etc.; quali conatu cum tubae pars anterior in motum agitatur, materiae laxius huic inhaerenti, loco mouendae saepius sufficiet. Apud DERHAMUM u) surdaster a catarrho, edito ad deglutiendum nixu, sub crepitu in aure

u) Cf. HALLERI elem. physiol. t. 5. L. 15.

S. 3. §. 5.

aure percepti sensu, et auditum recepit, similiaque exempla enarrat p. cl., SIMS x).  
Inde si nil profectum sit

II) Aeris in tubam acusticam violenta impulsio per expirationem validam, ore naribusque clausis susceptam, materiam impactam loco foras mouebit. Simplex hoc iamque a VALSALVA y) laudatum remedium, impense commendat cl. SIMS, idque omnibus ad tubam deobstruendam visitis auxiliis praeferendum censet. Vbi vnus modo lateris tuba obstructa est, sanam aurem cera obturare suadet, vt myringis in eadem aure laesio euitetur. Idem obtinetur, si gena laesae lateris, sub expirationis nisu dentibus impressa, omnis aeris impetus in tubam obstructam auertitur z). Nisi primo statim nisu auditus redit, repetitis conatibus opus est.

Quando al-

x) l. c.

y) l. c. cap. 5. §. 8. p. 84.

z) Vid. cl. BELL, Lehrbegriff der Wundarzn.  
a. d. E. 5. B. p. 355.



tius tubis Eustachii inhaeret materia ac firmius iisdem impacta est, ut methodis dictis loco moveri nequeat, tum

III) Iniectiones in tubam Eustachii instituendae sunt, quae triplicem in modum administrantur.

1) Liquor per os seu nares siphonis ope in tubam immittitur (cf. §. 33).

2) Fluidum ore exceptum, aeris vi in tubam impellitur (cf. §. 34).

3) Liquidum per processum mastoideum referatum ac tympani caueam in tubam inficitur (cf. §. 37).

Iniectionis per os administrandae, quam

primus proposuisse videtur GvvoT a) quamque in furdo feliciter adhibuisse testatur G.

ten

a) Maeh. et Invent. approuvées par l'acad.

ten HAAF *b*), methodus hic est. Aegri lingua instrumento idoneo depressa, tubus argenteus, longitudine ac crassitie sondae vulgaris, cuius anterius extremum paulo incuruatum, posterius vero syringi adnec-tendae idoneum est, ori inditur. Velo pendulo per expirationem validiorem nunc paulum eleuato, tubi pars inflexa postro-rum ac sursum, oblique versus tubae ob-structae orificium ducitur. Quod ubi atti-gerit ac intrauerit, tubae extremum poste-rius syringe, aqua tepida alioque liquore impleta iungitur, ac fluidum embolo leni-ter depresso in tubam iniicitur.

Attamen tubuli in tubam Eustachii in-troductio difficillima, tum et sternutatio in eius immissione vix euitabilis, plurimos ab hac operatione deterruerunt. Quare iam cl. PETIT *c*) ac DOUGLAS instrumentum per  
nasum

*b*) Samml. f. pr. Aerzte. 9. B. p. 438.

*c*) Annot. ad T. 2. PALFINI anat. chir.  
p. 472.



nasum tubae immittere proposuerunt, quem in finem instrumenta nonnulla breui post ab A. CLELAND *d)* fuere inuenta. Sequenti vero modo instituitur haec iniection. — Tubulus argenteus, supra descripto similis *e)*, parte conuexa superiora vergens, per meatum nasi inferiorem, retrorsum ac paulo deorsum, nusquam tamen offendendo, ducitur, donec ad tubae Eustachian. orificium ellipticum ac paulo prominens perueniat. Tunc inuertitur ita, vt conuexitas septum, concaua vero pars alam nasi spectet, et hac directione propulsus leniter, tubae facile illabetur. "Tubulum, rite intrasse, notante  
cl.

*d)* Vid. LESKE auserl. Abh. aus dem philos. Transact. 2. Th. n. 12. p. 29.

*e)* cl. CLELAND utebatur cannula cathederiformi, flexili. WATHENIUS vero tubulo argenteo, quem pro varia narium conformatione plus minus vno fine inflectebat. Extremum alterum syringi annexendae idoneum fuit.



cl. CALLISEN *f*) "cognoscimus ex di-  
 rectione instrumenti, et si manubrium  
 non amplius libere moueri potest, sensu  
 simul ingrato ad aurem internam extenso,  
 qui ab aegro percipitur. Tubulo nunc  
 syringe iuncto, fluidum in tubam iniicitur,  
 per os vel nares sordibus inquinatum ple-  
 rumque statim refluens. Irritationis mi-  
 nuendae causa cl. CALLISEN *g*) crines in  
 parte anteriore nasi obuios praecidere sua-  
 det. Nisi ad primam statim injectionem  
 auditus redeat, saepius iteranda est operatio.

Interea et huic methodo, a cl. WA-  
 THENIO in sex surdis *h*), ac a chirurgo  
 DRESDENSI *i*) in multis feliciter adhibito,  
 sequentia imprimis a variis opponuntur ar-  
 gumenta. Namque

*f*) Vid. eiusd. principia system. chir. hod.  
 P. 2. n. CCCXLI. p. 222.

*g*) l. c.

*h*) Cf. cl. LESKE l. c. p. 157. sqq.

*i*) Ibid. pag. 271.

morum auri secretionem promouenda facultatem multae confirmant observationes; plurimum expectandum esse videtur.

Nervi auditorii compressio, a tumore seu extravasato, cerebrum vel labyrinthi cavum occupante, orta, artis auxilia respuit; quae vero a vasorum nimia impletione pendet, horum depletionem saepius tolli poterit.

§. 42.

Vbi languoris ac atoniae nervi auditorii apparent indicia, remedia indicata sunt, quae languentes nervos excitare, vis nervae actionem restituere valent.

Potiora ex horum classe in auditus difficultate sananda reperta sunt haecce:

1) Tartarus emeticus, parca dosi ad nauseam usque exhibitus, ita tamen, ut interdum arga vomitumque ciens interponatur dosi *k*).

2) Fragrantia quaedam, ut moschus *l*), castoreum *m*), ambra *n*), zibethum *o*), cum

*k*) Vid. SCHMUCKERS v. ch. Schr. 2. B.

*l*) cf. FORESTUM l. c.

*m*) cf. cl. KRZOWITZ. op. 134.

*n*) Ibid, p. 132. *o*) Ibid.



cum interne fuinta, tum auri cum bombace intrusa.

3) Sulphuris viui, succini etc., accensi vapor, per infundibulum auribus immissus *p*).

4) Aromata vegetabilia fere omnia, vti caryophylli, thymus, maiorana, femina cumini, foeniculi etc.; quae hic vel integra masticari *q*), vel sacculis inclusa, aut pani impista *r*), auri imponi, vel quorum suffitu aures lustrari *s*) possunt. Infuso roris marini, lauendulae, ac corticis salicis, per processum mastoideum in tympani caueam injecto, eiusmodi surditatem perfecte curauit cl. FIELITZ *t*).

5) Alcalina volatilia, vti sal c. c., spiritus sal. ammon., simplex et compositus etc., tam interne quam imprimis externe adhibita. Puero, e capitis vulnere surdo, fumigatione auris volatili, e sale ammoniac. cum sale tartari parata, auditum restitui vidit cl. MICHAELIS *u*). — Perinde

6) Li-

*p*) Ibid. p. 125. *q*) RIVINUS diff. cit. §. 39.

*r*) KRZOWITZ p. 1128. *s*) Ibid. p. 131

*t*) cf. ill. RICHTER ch. B. 9. B. 31 St.

*u*) Ibid. 5. B. 1. St.



6) Liquores acustici varii, e praecedentibus ac fluidis spirituosus parati, a veteribus imprimis practicis cum successu saepius in usum vocabantur, vti aqua Anhaltina *x*), aqua acustica *y*) spiritus acusticus Mynsichti *z*), balsamum vitae Hoffmanni *a*) etc. Pau- cas eiusmodi liquoris guttulas tepide auri instillare, vel cum bombace immittere conueniet, aure prius probe expurgata. Li- quor per horas aliquot ceu noctem vnam sub decubitu in aurem sanam, ibi retinea- tur. — Sic etiam

7) Irritantia acriora, vti cantharides *b*), veratrum album, euphorbium, colocyn- thides, etc. forma pultis *c*), turundae *d*), ceu essentiae acusticae *e*) auri indita, a nonnullis commendantur. Emplastrum can- thari-

G 2

thari-

*x*) Vid. THONERI obs. med. L. 2. p. 117. sqq.

*y*) Dispens. Vienn. f. 8.

*z*) Arman. med. chym. sect. 18. p. 278.

*a*) SCHULZE diff. cit.

*b*) KRZOWITZ l. c. p. 148.

*c*) A. TRALLIANI Paraphr. L. I. c. 33.

*d*) H. CAPIVACCII med. pr. L. I. c. 50.

*e*) ETTMÜLLER opp. T. 2. P. 1. p. 737.

tharidum; emplastrum de VIGO *f*); ceratum de betonica; gummi Tacamahace, ac oleo maioranae *g*); occipiti rasō, ceruici, vel auris regioni admotum; balsamum lavendulae *h*), vitae Hoffmanni *i*); auris regioni illita, insignem saepius in hac auditus difficultatis specie praestant vim. Haud minoris perinde efficaciae in nerui auditorii torpore tollendo interdum reperitur

8) Soni validi perceptio. Euenit non raro, vti furdīs sub campanarum *k*), tympanorum *l*) sonitu, venti acrius flantis *m*), rhedae per plateas velociter vectae *n*), strepitu etc., auditus eo momento ita redeat, vt vel minimos sonos, imo mussitantium verba tum percipiant. Plerumque quidem strepitu cessante, auditus quoque pariter rursus interit, quandoque tamen perstantem audi-

*f*) cf. HOLLERIUM in Gal. de comp. med. p. 71.

*g*) HOECHSTETTER obs. med. dec. 9. cas. 4.

*h*) RIEDELINI lin. med. a. 5. p. 159.

*i*) SCHULZE diss. de inexp. med. effectu §. 16.

*k*) T. WILLISII de anim. brut. c. 14. §. 13.

p. 99.

*l*) Ibid. *m*) Act. Hafn. Vol. 5. obs. 77.

*n*) KRZOWITZ p. 206.

auditus restitutionem efficit eiusmodi fragor. Sic binis iuuenibus, ab ortu surdis mutisque sub tonitruum grauissimo fragore subito audiendi sensus rediit o). Simili modo amauroticis visum quandoque restituit lucis validae impressio p).

9) Irritamenta mechanica, quo imprimis pertinent

a) Embrocationes ad verticem, quorum egregiam in surditate sananda vim cl. FALLOPIUS q), et G. HORSTIUS r) in sibimet ipsis experti sunt. Viro, cui post insultum apoplecticum plenaria remanserat surditas, huius remedii ope sola auditum restituit cl. LASSER s).

b) Motus corporis succussui. Vir graviter audiens frequenter in altum subsiliendo a morbo sese vindicavit t). Alius, per XL iam annos cophosi aphonique multatus, dum

o) Annal. Wratisl. tent. 5. a. 1718. p. 1541.

p) Cf. ill. RICHTER Anfangsgr. der W. K. 3. B. §. 457.

q) Tract. d. med. aq. c. 26.

r) Epist. med. L. 2. S. 18.

s) cf. cl. SCHMUCKER l. c.

t) Act. med. Hafn. v. 5. obs. 126.



dum vice quadam terram foderet, medio in labore auditum subito recepit *u*). Similem totius organi commotionem efficere valent

*c*) Errhina, quae in surditatis curatione cum aliis remediis vtiliter saepe coniunxit cl. RULANDUS *x*). Sternutationi forti,

spontè obortae pertinacissima interdum cessit cophosis *y*). — Omnium interim id genus excitantium efficacissimum sese exhibuit

*d*) Electricitas, cuius adhibendae methodi sequentes imprimis sunt: 1<sup>mo</sup>) Materia electrica ope acus lignae, auri laesae applicatae, ex aure deriuatur. Aegro insulato materia, per catenam vel filum metallicum conductori iunctum antea aduehitur. 2<sup>do</sup>) Scintillae ex aure proliciuntur. 3<sup>o</sup>) Ictus electrici auri laesae applicantur. — Electricitatis, auri adplicatae, cuius eximiam in surditate sananda vim numerosae testantur observationes, primus effectus in partium auris mollium intumescencia inflammatoria leui consistit, obauditionem in primis saltem

die.

*u*) St. v. d. Wiel. obs. rar. med. ct. 2. obs. 5.

*x*) Cur. empir. cent. 8. cur. 55.

*y*) cf. cl. KRZOWITZ p. 157. seqq.

diebus plerumque adaugente. Huic post aliquot dies succedit ceruminis fluidioris ac verosimillime etiam humorum auris internae secretio largior, sub qua tumor sensim decrescit, nec raro audiendi facultas pariter redit. z).

§. 43.

Quando denique nervus auditorius irritabilitate nimia muneri suo defungendo impar reddi videtur, medicamina convenientia, quae nervorum irregulares motus sopiunt, eosque erga stimulorum impressiones obtundunt, tam interna quam topica. Hyoscyamus albus, cicuta a), opiata ac similia hic imprimis indicata esse videntur, quorum efficacia eo maior erit, si sedantium externorum applicatio eorum usui simul iungitur. Liquores acustici antispasmodici, oleosi, uti aqua the-rica b), oleum sacusticum ambratum c), Ol. acust. Mercati d), oleum amygdalarum

ama.

z) Efficaciae huius remedii complura exempla

videntur apud cl. KÜHN l. c.

a) KRZOWITZ p. 122. 199.

b) I. ZECHIAS conf. med. 23.

c) Dispens. Vienn. f. 130.

d) Tom. 3. de int. morb. cur. L. 1. c. 24.



amararum *e*), ol. ovorum *f*), fabarum ad mollitiem coctarum vapor, vel farinae carbonibus injectae fumus *g*), auri immissa, in eiusmodi nerui auditorii statu praecipue sese commendant. A butyro maiali infuso, vertici ac temporibus quotidie infricato, surdus octogenario maior integrum recepit auditum.

*d*) V. RIEDLINI cur. med. n. 856.

*e*) Act. nat. cur. Vol. I. obs. 40.

*f*) KRZOWITZ l. c. p. 129. sqq.

*g*) Cf. Misc. n. c. Dec. 3. a. 5. obs. 146.

## T H E S E S.

- I. Constrictio annuli abdominalis sola quandoque herniam inguinalem incarcerat.
- II. Orificium vteri rotundum certum grauiditatis signum non praebet.
- III. Liquor amnii foetus nutritioni non inseruit.
- IV. Purpuram subinde morbum primum esse contendo.
- V. Error in diagnosi inter febrem biliosam ac enteritidem facillime nec sine summo aegri discrimine committitur.
- VI. Opiata in febrium intermittentium cura circumspectum requirunt usum.
- VII. Gangraena lienis pecudum infectis non tribuenda esse videtur.
- VIII. Asservatio funerum in propriis aedificiis sepulturae praematurae ac nimis serae pericula optime aufert.





